

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

COMBITREM

Emulsie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO „Brovafarma”, Ucraina , or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Combitrem emulsie - pentru uz intern. 1 ml de preparat conține în calitate de substanțe active: triclabendazol-50 mg, albendazol-100 mg și excipienți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Dehelmintizarea în grup sau individual a bovinelor, ovinelor, caprinelor în cazul fasciolozei și helmintozelor asociate.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra femeilor gestante în primul trimestru, ovinilor în timpul montei și o lună după ea.

5. REACȚII ADVERSE

În doze terapeutice (conform instrucțiunii date) nu provoacă reacții adverse. Supradozările se manifestă prin acțiune hepatotoxică (hepatite toxice), alopecii și depresie. Acțiune teratogenă, mutagenă, cancerigenă și sensibilizantă nu posedă. Doza de 4 ori mai mare poate provoca la animalele gestante acțiune toxică asupra fătului.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Combitrem emulsie se administrează intern, în amestec cu apă, în următoarele doze:

Bovine - 1 ml/10 kg masă corp, o singură dată, cu apa de băut.

Ovine, caprine - 0,75 ml/10 kg masă corp, o singură dată.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne - 14 zile, laptele se da în consum uman peste 2 zile de la ultima administrare.

Până la expirarea termenului limită, carcasele se dau în hrana animalelor neproductive sau se practică (în dependență de decizia medicului veterinar).

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C +4°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A se omogeniza bine cu apa! În lucru cu pregătirea Combitrem nu se recomandă admiterea femeilor însărcinate. În timpul manipulărilor a se evita contactul direct cu pielea sau tunicile mucoase.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă sau polimer a câte 50; 100; 300 ml; 1 Litru și canistră din plastic a câte 5 și 10 litri.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru