

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

DITRIM

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO "NITA-FARM", 410010, or. Saratov, str. Osipova V. I. 1, Tel/fax: +7(4852)338-600
E-mail: client@nita-farm.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Soluția injectabilă Ditrim conține în 1 ml următoarele substanțe active: 200 mg sulfadimezină și 40 mg trimetoprim

Adjuvanți 2- pirolidon, alcool benzilic, tiosulfat de sodiu, EDTA sare disodică și apă pentru injecții

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ditrim se indică bovinelor, porcinelor, cabalinelor și câinilor în tratamentul infecțiilor bacteriene ale organelor respiratorii, tractului digestiv și urogenital, ale căror agenți patogeni sunt sensibili la sulfadimezină și trimetoprim.

4. CONTRAINDICAȚII

Se interzice administrarea preparatului Ditrim animalelor cu sensibilitate individuală sporită la sulfonamide și diaminopirimidine, în caz de patologii grave ale ficatului, rinichilor, organelor de hematopoeză și animalelor gestante.

Nu se administrează concomitent cu preparate ale acidului p-aminobenzoic (novocaină, procaină, anestezină, benzocaină) și nu se amestecă într-o seringă cu alte substanțe.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii, nu apar reacții adverse. În unele cazuri, animalele pot manifesta o ușoară tumefiere și roșeață în locul injectării, care dispar de la sine.

6. SPECIȚINTĂ

Bovine, porcine, cabaline și câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Ditrim se administrează intramuscular în latura gâtului (cabalinelor intravenos), o dată pe zi, în doză de 1 ml/10 kg masă corporală. În cazuri grave, în primele 2-3 zile, preparatul se administrează de 2 ori pe zi, cu un interval de 12 ore, în aceeași doză.

Din cauza posibilei reacții de durere, nu se recomandă administrarea într-un singur punct la bovine, porcine și cabaline a unei cantități mai mari de 10 ml, iar la porci și câini – mai mult de 5 ml.

Durata tratamentului este de 3-7 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea animalelor pentru consum uman se permite după 28 de zile de la ultima administrare. Carcasele obținute înainte de expirarea acestui termen se folosesc pentru hrana animalelor carnivore.

Laptele se permite pentru consum după 5 zile de la ultima administrare a preparatului Ditrim sau poate fi utilizat în hrana animalelor după prelucrare termică.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la temperaturi între 5°C și 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

În caz de supradozare sau prelungirea curei de tratament, pot apărea disfuncții renale sau ale tractului digestiv (disbacterioză). În astfel de cazuri, se oprește administrarea și se aplică tratament simptomatic cu vitamine și probiotice.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Valabilitate: 2 ani din data producerii, după deschiderea flaconului – nu mai mult de 28 de zile.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă întunecată de 20, 50 și 100 ml, cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL "Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru