

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### FENPRAZ

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

AO"Agrobioprom",105064, Rusia, or. Moscova, str. Kazakova 6/1  
Producator AO"Agrobioprom",143985, reg.Moscova, Balașiha, ș.Poltevskoe 4

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Fenpraz pastile (Fenpraz tablets) - denumirea internațională nepatentată:  
fenbendazol, pirantel, praziquantel.

Medicamentul se produce în 4 dozaje diferite:

- **Pentru motănași și pisici:**

1 pastilă/4 kg greutate corporală: conține, în calitate de substanțe active:

- fenbendazol: 60 mg
- pirantel pamoat: 56 mg

- praziquantel: 20 mg

- **Pentru căței și câini de talie mică:**

1 pastilă/5 kg greutate corporală: conține, în calitate de substanțe active:

- fenbendazol: 75 mg
- pirantel pamoat: 70 mg
- praziquantel: 25 mg

- **Pentru căței și câini de talie medie:**

1 pastilă/8 kg greutate corporală: conține, în calitate de substanțe active:

- fenbendazol: 120 mg
- pirantel pamoat: 112 mg
- praziquantel: 40 mg

- **Pentru căței și câini de talie mare:**

1 pastilă/15 kg greutate corporală: conține, în calitate de substanțe active:

- fenbendazol: 225 mg
- pirantel pamoat: 210 mg
- praziquantel: 75 mg

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Fenpraz pastile se indică câinilor și pisicilor de la vârsta de 3 săptămâni, în profilaxia și tratamentul nematodozelor (toxocaroză, toxocarioză, uncinarioză, anchilostomoză, trichocefaloză), cestodozelor tractului digestiv (tenioză, dipilidioză, echinococoză, difilobotrioză, mesocestoidoză), în giardioză și în invazii mixte.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

Sensibilitatea individuală sporită la componentele preparatului (inclusiv în anamneză). A nu se administra animalelor slăbite, bolnave de boli infecțioase sau în perioada de convalescență. Tineretul cu vârsta sub 3 săptămâni, femelele gestante în primul semestru al gestației și primele 2-3 săptămâni după fătare nu se dehelmintizează. A nu se administra concomitent cu piperazina, levamisolul și preparatele inhibitoare de colinesterază, deoarece se poate intensifica reciproc toxicitatea.

### **5. REACȚII ADVERSE**

Reacții adverse și complicații la administrarea conform instrucțiunii date nu apar. În caz de sensibilitate sporită, se pot manifesta diaree, vomă sau hipersalivație. Aceste simptome sunt de scurtă durată și dispar de la sine.

## 6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

## 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Fenpraz pastile se administrează animalelor pe cale orală, individual, fie în amestec cu puțină hrană, fie forțat pe rădăcina limbii. Nu este necesară o dietă de post sau administrarea laxativelor. În timpul dehelmintizării animalelor, se recomandă dezinfectarea și dezinviaza obiectelor cu care animalul intră în contact (cușca, pătuț, jucării) pentru a preveni reînfestările. Cu scop curativ, animalele se dehelmintizează la indicația medicului veterinar; preventiv, se recomandă trimestrial, cu 10-14 zile înainte de vaccinare și cu 10 zile înainte de data presupusă a fătării, în dozele indicate în tabel.

Specia animalului	Greutate corp	Doza
Motănași și pisici	<1 kg	¼ pastilă
	1-2 kg	½ pastilă
	2-3 kg	¾ pastilă
	3-4 kg	1 pastilă
	<b>1 pastilă la fiecare 4 kg de greutate corporală</b>	
Căței și câini de talie mică	2,5 kg	½ pastilă
	5 kg	1 pastilă
	10 kg	2 pastile
	<b>1 pastilă la fiecare 5 kg de greutate corporală</b>	
Căței și câini de talie medie	<2 kg	1/4 pastilă
	4 kg	1/2 pastilă

	8 kg	1 pastile
	<2 kg	1/4 pastilă
	<b>1 pastilă la fiecare 8 kg de greutate corporală</b>	
Căței și câini de talie mare	15 kg	1 pastilă
	30 kg	2 pastilă
	45 kg	3 pastile
	60 kg	4 pastle
	<b>1 pastilă la fiecare 15 kg de greutate corporală</b>	

În tratamentul giardiozei, Fenpraz pastile se administrează o dată pe zi, timp de 3 zile consecutive. Se recomandă respectarea dozelor și termenilor indicați pentru a nu diminua eficiența preparatului. Nu au fost înregistrate particularități deosebite la prima administrare sau la excluderea preparatului. În cazul omiterii unei administrări, se va recurge la terapie cât mai curând posibil, folosind aceeași doză și conform aceleași scheme.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

#### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 0°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

### **11.ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Administrarea Fenpraz pastile femelelor gestante sau în lactație se determină de medicul veterinar, analizând riscurile și beneficiile. Supradozarea poate provoca apatie, inapetență, hipersalivație, diaree sau vomă. În astfel de cazuri, se recurge la terapie simptomatică.

### **12.PERIOADA DE VALABILITATE**

În ambalajul producătorului - 3 ani din data producerii. A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

### **13.STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

### **14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Fenpraz pastile se produce ambalat a câte 2, 6 sau 10 bucăți în blistere; a câte 6 sau 10 bucăți în flacoane din polimer cu capac filetat securizat.

### **15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)