

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **BIOKILL 2,5 mg/ml**

spray cutanat

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1.DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**  
Bioveta, a.s., Komenského 212, 68323 Ivanovice na Hané, Republica Cehă

**2.DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**  
Biokill 2,5 mg/ml spray cutanat conține ca substanță activă permetrin și adjuvanți.

### **3.INDICAȚII TERAPEUTICE**

Se indică împotriva ectoparaziților purici păduchi căpușe la câini cobai hamsteri și păsări exotice Se poate folosi și împotriva insectelor furnici muște păianjeni și pentru dezinfecția cuștilor și cuibarelor.

#### Câini

Purici din familia *Pulicidae* *Ctenocephalides canis* *Ctenocephalides felis*  
Păduchi *Linognathus setosus*.

Acarieni *Ixodes ricinus Haemaphysalis concinna Dermacentor reticulatus Dermacentor marginatus*. Malofagi *Cheyletiella yasguri Trichodectes canis*.

#### Cobai

Acarieni *Ixodes ricinus Haemaphysalis concinna Dermacentor reticulatus Dermacentor marginatus*.

Paraziți *Spilopsyllus cuniculi Demodex criceti Notoedres cati*.

#### Hamsteri

Acarieni *Ixodes ricinus Haemaphysalis concinna Dermacentor reticulatus Dermacentor marginatus*.

Paraziți *Spilopsyllus cuniculi Demodex criceti Notoedres cati*.

#### Păsări exotice

Acarieni *Ixodes ricinus Haemaphysalis concinna Dermacentor reticulatus Dermacentor marginatus*.

Paraziți *Argas vulgaris Argas reflexus Ceratophyllus gallinae Knemidocoptes mutans K pilae Dermanyssus gallinae*.

*Prevenirea miazelor și atacurilor insectelor înțepătoare diptere*

Țânțari *Culex pipiens Aedes vexans Culicoides obsoletus Culicoides pulicaris*.

Muște *Eusimulium latipes Prosimulium hirtipes Odagmia ornata Musca domestica Stomoxys calcitrans*.

Nimicirea *Tabanus spp Culicoides spp*.

Biokill 2,5 mg/ml poate fi folosit și pentru prevenirea infestației mediului cu speciile de paraziți menționați mai sus.

#### **4. CONTRAINDICAȚII**

A nu se folosi la pisici – este toxic.

Preveniți contactul pisicilor cu câinii tratați cu Biokill 2,5 mg/ml.

#### **5. REACȚII ADVERSE**

Salivație excesivă, semne neurologice tranzitorii (iritabilitate, hiperactivitate, tremor muscular), vomă.

#### **6. SPECII ȚINTĂ**

Câini, cobai, hamsteri, păsări exotice.

## **7.POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

*A se agita înainte de administrare!*

Biokill 2,5 mg/ml se aspersă contra direcției de creștere a blănii sau penajului, până la umectarea acestora și a pielii Animalele cu blană lungă se vor pieptăna simultan În funcție de dimensiunea animalului și densitatea blănii, până la umectarea pielii.

10 mg permetrin (4 ml de preparat) per 1 kg corp animal, astfel

20 aspersări dintr-un ambalaj de 100 ml/1 kg corp animal sau

4 aspersări dintr-un ambalaj de 500 ml/1 kg corp animal

Pentru dezinfecția mediului pulverizați în cuști, cotețe, grajduri, cuibare până la umezire, aproximativ 25 ml/m<sup>2</sup> (125 aspersări dintr-un ambalaj de 100 ml sau 25 aspersări dintr-un ambalaj de 500 ml) În caz de necesitate, prelucrarea se repetă la interval de 1-2 săptămâni.

## **8.PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Nu se administrează animalelor destinate consumului uman.

## **9.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la temperaturi sub 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

## **10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11.ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit Se recomandă aspersarea în spații bine aerisite, preparatul fiind iritant pentru tractul respirator. Este recomandată reducerea manipulărilor animalelor pentru 12-24 ore după aplicare și evitarea contactului cu copii. Nu dormiți cu animalele tratate. A nu se aspersa în acvarii și heleștee. Este toxic pentru pești, albine și reptile.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

În ambalajul original al producătorului – 2 ani.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

## **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează cu prescripție veterinară.

## **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacon alb din polietilenă cu pulverizator mecanic de 100 și 500 ml .

## **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)