

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Trisulfon 40 mg + 20 mg/g

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Deținătorul certificatului de înregistrare:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto
Slovenia

Producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

KRKA, d.d., Smarjeska cesta 6, 8501, Novo mesto, Slovenia

KRKA, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501, Novo mesto, Slovenia

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Trisulfon 40 mg + 20 mg/g – pulbere microgranulată perorală.

Trisulfon 40 mg + 20 mg/g pulbere orală.

Substanțe active:

- Sulfamonometoxină (sub formă de sare sodică) – 40 mg

- Trimetoprim – 20 mg

Excipienți:

- Lactoză monohidrat.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

- **Viței, iezi, miei:** în caz de colibacterioză, salmoneloză, pasteureloză, bronhopneumonie, abcese cauzate de stafilococi, poliartrite cauzate de streptococi;
- **Porci:** în caz de colibacterioză, rinită atrofică, salmoneloză, pasteureloză, pleuropneumonie cauzată de Haemophilus spp.;
- **Păsări:** în caz de pasteureloză, colibacterioză, salmoneloză, stafilococoză;
- **Iepuri:** în caz de pasteureloză, stafilococoză, colibacterioză, salmoneloză.

4. CONTRAINDICAȚII

- Hipersensibilitate la componentele medicamentului.
- Este interzisă utilizarea Trisulfon la:
 - Animalele rumegătoare adulte cu digestia în prestomac dezvoltată.
 - Animalele cu disfuncție renală sau hepatică.
 - Găinile ouătoare, ale căror ouă sunt destinate consumului uman.ă.

5. REACȚII ADVERSE

La utilizarea Trisulfon în conformitate cu prezentul rezumat, reacțiile adverse și complicațiile la animale nu sunt, de obicei, observate. În caz de hipersensibilitate individuală la medicament și apariția reacțiilor alergice, se va opri utilizarea medicamentului și se vor administra antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Viței, iezi, miei, porci, păsări de curte, iepuri.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Trisulfon se utilizează la viței, iezi, miei și porci, fie oral individual, fie prin metoda de grup.

Doza zilnică pentru toate tipurile de animale este de **10 g de pulbere orală TRISULFON la 40 kg** de greutate corporală. Medicamentul trebuie administrat în apa de băut sau amestecat cu nutrețuri timp de **5 zile consecutive**. În timpul tratamentului, animalele trebuie să primească doar apă sau nutreț care conține **Trisulfon**.

Păsări de curte și iepuri:

- **Păsări de curte:** Pentru tratamentul coccidiozei, doza este de 800 g de pulbere orală TRISULFON în 100 litri de apă de băut, timp de 3-5 zile.

Pentru tratamentul altor boli, doza zilnică este de 200 g de pulbere orală TRISULFON în 100 litri de apă de băut.

- **Iepuri:** 8 g de pulbere orală TRISULFON în 1 litru de apă de băut, durata tratamentului fiind de 5 zile.

În timpul tratamentului, păsările și iepurii trebuie să primească doar apă care conține Trisulfon.

Soluția sau nutrețul cu medicament trebuie preparate zilnic.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea animalelor și păsărilor pentru consum alimentar se admite nu mai devreme decât după 10 zile de la ultima utilizare de Trisulfon.

Animalele sacrificate înainte de termenul indicat se utilizează conform legislației naționale privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

- Particularitățile de acțiune a medicamentului la prima administrare și la întreruperea lui nu s-au stabilit.

- Se va evita omiterea unei doze, deoarece eficacitatea medicamentului poate fi redusă. În cazul omiterii unei doze, utilizarea se va relua în aceeași doză și conform aceleiași scheme.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

- Toate lucrările cu medicamentul se vor efectua cu utilizarea hainelor speciale și a mijloacelor individuale de protecție (mănuși de cauciuc, ochelari de protecție, mască respiratorie sau de protecție).
- În timpul lucrărilor se interzice fumatul, consumul lichidelor sau alimentelor.
- După finalizarea lucrărilor, se vor spăla minuțios mâinile cu apă și săpun.
- Persoanele cu hipersensibilitate la trimetoprim sau sulfanilamide trebuie să evite contactul direct cu medicamentul.
- Ambalajele goale de sub medicament se vor nimici împreună cu deșeurile menajere.
- În cazul unui contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele, acesta trebuie îndepărtat imediat cu apă curgătoare și săpun.
- În caz de reacții alergice și/sau de ingestie accidentală, se recomandă contactarea imediată a unei unități medicale, având la îndemână prospectul medicamentului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Medicamentul poate fi utilizat la scroafe gestante și în lactație și la animalele tinere.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar sau alte forme de interacțiune:

- Medicamentul nu trebuie utilizat concomitent cu acid paraaminobenzoic, procaină și alte anestezice locale.
- De asemenea, nu trebuie utilizat concomitent cu vitaminele grupei B (nicotinamidă, acid folic, colină) datorită acțiunii lor antagoniste asupra sulfonamidelor.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot):

- Simptomele de supradozaj la animale nu s-au stabilit.
- În caz de supradozaj semnificativ la animale, pot apărea simptome de inhibare generală și refuzul hranei.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – 30 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Trisulfon este disponibil câte 1 kg în pungi din folie laminată, închise ermetic.
Fiecare ambalaj este însoțit de prospect.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru