

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ivermec OR

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

ZAO „ Nita-Farm”, or.Saratov

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ivermec OR - 1 ml conține în calitate de substanțe active: ivermectină – 10 mg și tocoferol acetat (vitamina E) – 40 mg și substanțe adjuvante: dimetilacetamid -400 mg, polietilenglicol - 660 – hidroxistearat – 150 mg, alcool benzilic 10 mg și apă pentru injecții- până la 1 ml.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ivermec OR se indică cu scop preventiv și curativ în cazul nematodozelor și entomozelor. Găinilor (puilor de carne, păsărilor de prăsilă, tineretului de înlocuire și găinilor în timpul năpârlirii) în cazul ascaridiozei, heterachidozei, capilariozei entomozelor provocate de *Dermatoryktes mutas*, *Aphaniptera spp.*, *menacanthus stramineus*, *Ceratophyllus gallinae*, acaroze provocate de *Dermanyssus gallinae* (capușa roșie), *Knemidocoptes mutans*, *Menopon gallinae*.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală la componentele preparatului. Nu se recomandă administrarea găinilor ouătoare și tineretului de înlocuire cu 14 zile înainte de ouatul în masă, din cauza acumulării ivermectinei în ouă. Nu se administrează concomitent cu lactonele macrociclice din cauza intețirii acțiunii toxice reciproce.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii, reacții adverse și complicații nu apar. În cazul supradozării la păsările domestice apare apatie, tremor muscular, lipsa poftei de mîncare, diaree. Preparat specific detoxicant lipsește, se folosesc remedii care sporesc eliminarea preparatului din organism și preparate simptomatice.

6. SPECII ȚINTĂ

Găini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Găinilor (pui de carne, păsărilor de prăsilă, tineretului de înlocuire și găinilor în timpul năpârlirii) Ivermec OR se administrează intern, în grup, cu apa de băut în doză de 400 mkg ivermectină la 1 kg masă corp a pasării, ceea ce corespunde la 0,4 ml/1 l de apă. Pentru prepararea soluției curative, cantitatea necesară de preparat Ivermec OR se diluiază în $\frac{1}{4}$ din volumul diurn consumat de apă. Se administrează în cazul nematodozelor o singură dată, în entomoze- de 3 ori: primele 2 ori cu interval de 24 ore și peste 14 zile.

Pentru un consum garantat a soluției curative, cu două ore înainte de administrare, apa de băut se exclude.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Pentru carne – 9 zile, pentru ouă – 14 zile de la ultima administrare a preparatului Ivermec OR. În caz de sacrificare până la expirarea termenului limită, carcasele se dau în hrana animalelor de blană.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Pentru un consum garantat de soluție curativă, cu 2 ore înainte de administrare ,apa se exclude.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere - 42 de zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Preparatul se prezintă ca o soluție transparentă incoloră sau pal-gălbuie. Se ambalează a câte 400, 500 și 1000 ml în sticle din polimer cu capacele swift off din plastic.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru