

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **ALBEN Granulat**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

ООО “ NVТ Agrovetzashcita “,141300, Rusia, reg.Moscova, or.Serghiev Posad, str. Tsentralinaia 1

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Alben granulat - pulbere pentru uz intern.

1g de preparat conține:  
albendazol - 200mg și excipienți.

**3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Alben granulat se indică pentru dehelmintizarea bovinelor, ovinelor și caprinelor în cazul:

- Nematodoze gastrointestinale: *Haemonchus sp.*, *Bunostomum sp.*, *Oesophagostomum sp.*, *Chabertia ovina*, *Strongyloides spp.*, *Trichocephalus spp.*, *Nematodirus sp.*, *Ostertagia spp.*, *Cooperia sp.*
- Nematodoze pulmonare: *Dictyocaulus spp.*, *Protostrongylus spp.*, *Metastrongylus spp.*
- Cestodoze: *Moniezia expanza*, *Moniezia benedeni*, *Avitellina sp.*, *Diphyllobothrium latum*
- Trematodoze: *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, *Paramphistomum spp.*

#### 4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la albendazol. A nu se administra în cazul fasciolozei acute, animalelor istovite și bolnave de boli infecțioase.

Se interzice administrarea Alben granulat în timpul monei.

#### 5. REACȚII ADVERSE

În doze terapeutice (conform instrucțiunii date) nu provoacă reacții adverse. În caz de sensibilitate individuală sporită și apariția reacției alergice, administrarea se stopează și se indică terapie simptomatică.

#### 6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, caprine, ovine.

#### 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

- Dehelmintizarea animalelor se efectuează:
  - **Curativ:** La indicația medicului veterinar.
  - **Preventiv:** Primăvara, înainte de pășunat, și toamna, înainte de stabulație.
- Nu este necesară o dietă specială sau administrarea laxativelor în prealabil.

##### Mod de administrare și dozaj

- Alben granulat se administrează per oral, individual sau în grup, în amestec cu hrana.
- **Frecvență:** O singură administrare.
- **Doze:** Pentru bovine, ovine și caprine, în funcție de greutatea corporală, conform tabelului (nefurnizat).

Notă: Tabelul cu dozele specifice nu a fost inclus. Vă rugăm să furnizați tabelul pentru a completa informațiile:

<b>Specia animalului</b>	<b>Doza Alben granulat, g/kg masă corp</b>
BOVINE în fascioloză, paramfistomidoză, ostertagioză	3,75g/100kg  5,0g/100kg
OVINE,CAPRINE În fascioloză, protostrongilidoză	2,5 g/100kg  3,75 g/100kg

### **Administrare în grup**

- **Metodă:** Doza calculată de Alben granulat se omogenizează cu combifurajul în cantități raportate per animal:

- **Bovine:** 0,5-1,0 kg
- **Ovine, caprine:** 150-200 g

- Amestecul medicamentat se plasează în iesle pentru un grup de 10-100 animale, oferindu-le acces liber la iesle.

### **Lingura dozatoare**

- Inclusă în pachet, cu următoarele măsuri:

- Fără vârf: 5,0 g de medicament
- Prima măsură de jos: 2,5 g
- A doua măsură: 3,75 g

Testare prealabilă

- Înainte de dehelmintizarea în masă, fiecare serie de medicament se testează pe un grup mic (5-10 animale de fermă).

- Dacă nu apar complicații în decurs de 3 zile, se procedează la dehelmintizarea întregului șeptel.

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Sacrificarea animalelor - 20 zile.

Lapte - 4 zile.

Carcasele, lapte obținute înainte de expirarea termenului limită-se dă în hrana animalelor carnivore.

Peștele poate fi folosit în consum uman peste 18 zile (dacă temperatura apei e mai sus de 8°C).

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Administrarea concomitentă a medicamentului cu praziquantel, azinox sau dexametazon duce la majorarea concentrației albendazolului în sânge.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

## **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

## **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Pachet din material combinat de câte 20 g, pachete din hârtie stratificată de câte 0,5 kg și 1 kg, saci din hârtie stratificată de câte 5, 10, 15 și 20 kg; borcane din polimer de câte 1,0 kg; căldări din polimer de câte 5,0 și 10 kg și linguri de măsurare.

## **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)