

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ciprovet 5% (soluție injectabilă)

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "AVZ S-P", Rusia, 141305, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Ţentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ciprovet 5% – soluție injectabilă.

Compoziție

1 ml de soluție conține:

- **Substanțe active:**
 - Ciprofloxacina – 50 mg/ml
- **Excipienți:**
 - Acid succinic

- Trilon B
- Apă pentru injecții.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se indică în scop curativ bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, câinilor și pisicilor pentru tratamentul bolilor infecțioase de etiologie bacteriană, inclusiv:

- Afecțiuni ale tractului gastrointestinal;
- Afecțiuni ale căilor respiratorii;
- Afecțiuni ale tractului urogenital;
- Afecțiuni ale articulațiilor, țesuturilor moi și pielii;
- Necrobacterioză;
- Bronhopneumonie;
- Colibacterioză;
- Salmoneloză;
- Pasteureloză;
- Micoplazmoză;
- Infecție ombilicală;
- Rinită atrofică;
- Sindromul mastită-metrită-agalaxie (MMA) la porci;
- Alte infecții primare și secundare cauzate de agenți patogeni sensibili la ciprofloxacina.

4. CONTRAINDICAȚII

- Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă (ciprofloxacina) sau la oricare dintre excipienți (inclusiv în anamneză).
- Nu se utilizează în caz de disfuncții renale sau hepatice.
- Utilizarea medicamentului nu este permisă în cazul:
 - Tulburărilor semnificative în dezvoltarea țesutului cartilajinos;
 - Afectărilor sistemului nervos însoțite de convulsii.
- Se interzice utilizarea medicamentului la căței și pisoi în primul an de viață, până la sfârșitul perioadei de creștere.

5. REACȚII ADVERSE

- La administrarea medicamentului de uz veterinar Ciprovet 5% conform prospectului, nu apar reacții adverse sau complicații.
- În caz de sensibilitate individuală sporită la componentele medicamentului și apariția reacțiilor adverse (inapetență, edem, ataxie, tulburarea coordonării mișcărilor), administrarea se întrerupe și se recomandă terapie desensibilizantă și simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

- Se administrează subcutanat sau intramuscular:

- **Doza generală:** 1 ml/10 kg greutate corporală (5 mg ciprofloxacină/1 kg greutate corporală), o dată pe zi, timp de 3-5 zile;

- **Porcine cu sindromul MMA:** 1 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 2 zile;

- **Câini și pisici:** Subcutanat, 1 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 5-10 zile.

Recomandări privind administrarea corectă

- Volumul maxim admis pentru o singură injecție într-un punct nu trebuie să depășească:

- Bovine: 15 ml

- Porcine: 10 ml

- Ovine și viței: 5 ml

- Purcei: 2,5 ml

- Câini: 2 ml

- Pisici: 1 ml.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

- **Sacrificarea pentru consum uman:**

- Bovine: Nu mai devreme de 28 de zile de la ultima administrare a medicamentului Ciprovet 5% injectabil.

- Porcine: Nu mai devreme de 14 zile de la ultima administrare.

- Carcasele animalelor sacrificate înainte de expirarea perioadei de așteptare pot fi utilizate în hrana animalelor de blană.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă

- Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

- Nu s-au stabilit particularități deosebite de acțiune ale medicamentului la prima administrare sau în caz de întrerupere.
- Se recomandă respectarea dozajului indicat și a modului de administrare pentru a nu diminua eficiența terapeutică.
- În caz de omitere a unei doze, administrarea se reia în aceeași doză, conform schemei stabilite.

Precauții speciale pentru persoana care administrează medicamentul

- În timpul manipulării medicamentului, este important să se respecte regulile comune de igienă personală și tehnicile de siguranță prevăzute pentru lucrul cu medicamente de uz veterinar.
- În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele oculare, acestea trebuie spălate abundant cu apă.
- Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Ciprovet 5% injectabil.
- În caz de reacții alergice sau ingerare accidentală, se recomandă adresarea cât mai rapidă la o instituție medicală, având la îndemână prospectul sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație și lactație

- Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

- Nu se admite administrarea concomitentă a Ciprovet 5% injectabil cu:
 - Antibiotice bacteriostatice (levomicetină, macrolide și tetraciline);
 - Teofilină;
 - Antiinflamatoare nesteroidiene.

Supradozare

- În caz de supradozare a medicamentului, pot apărea următoarele simptome:
 - Inapetență;
 - Apatie;
 - Vomă.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 21 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

- Medicamentul de uz veterinar Ciprovet 5% injectabil se produce ambalat în flacoane din sticlă întunecată, în volume de 10, 20, 50, 100 și 200 ml.
- Flacoanele sunt închise cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.
- Flacoanele de 10, 20 și 50 ml sunt plasate în cutii împreună cu instrucțiunea de utilizare.
- Fiecare ambalaj este însoțit de instrucțiuni.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru