

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **Brovitacoccid**

Pulbere

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

#### **1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

OOO “Brovafarma”, Ucraina , or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

#### **2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Brovitacoccid - pulbere orală. 1 gr conține în calitate de substanțe active: amprolium clorhidrat -125 mg, vitamina K<sub>3</sub>- 2 mg, vitamina A -10000 UI și adjuvanți.

#### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Tratamentul și profilaxia păsărilor (găini, curci, găște, fazani, porumbei) în cazul eimeriozelor provocate de:

- la găini- Eimeria acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. tenella;
- la curci- Eimeria adenoeidis, E. meleagrimitis;

- la fazani- Eimeria colchii;
- la găște- Eimeria anseria, E. nocces, E. truncate;
- la porumbei- Eimeria labbeana.

#### **4. CONTRAINDICAȚII**

A nu se administra găinilor ouătoare.

Nu se indică tineretului de înlocuire cu vârsta mai mare de 4 luni.

#### **5. REACȚII ADVERSE**

Administrarea de lungă durată poate duce la carența de vitamina B<sub>1</sub>.

#### **6. SPECII ȚINTĂ**

Păsări (găini, curci, găște, fazani, porumbei).

#### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Brovitacoccid se administrează animalelor și păsărilor în amestec cu apa sau hrana, pregătind amestecul necesar pentru 1 zi. Se administrează uniform pe parcursul unei zile.

- **păsări** (găini, curci, găște, fazani, porumbei):

profilaxie - pui până la 2 luni, zilnic- 0,9-1g/1 kg furaj;

pui 2-4 luni, zilnic - 0,7g/1 kg furaj;

4 luni până la ouat- 0,4g/1 kg furaj;

pui broiler, curci- 1 g/1 kg furaj- toată perioada de creștere

boboci, fazani, porumbei - în perioada pericol de invazie;

tratament – indiferent de specie și vârsta păsărilor -2 g/1 kg de furaj sau 1 l apă , timp de 5-10 zile.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Păsări- 7 zile la ultima administrare a dozei curative.

#### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos , separat de produse alimentare și furaje, la T°C +4°C +20°C, în locuri inaccesibile copiilor.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

#### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Amestecul de Brovitacoccid cu apă sau furaj se pregătește pentru o zi și se administrează uniform, pe parcursul acesteia.

#### **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

1 an din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

#### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

#### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Container din polimer sau pachet din hârtie laminată a câte 10; 30; 50;100 și pachete din polietilenă a câte 500 și 1000 g.

#### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)