

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

BROVAFERAN 100

soluție injectabilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Brovafarma", Ucraina, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Brovaferan 100- soluție injectabilă de culoare brună -roșiatică.

1 ml conține :

100 mg de fier III (complex al hidroxidului de fier cu dextran) și adjuvant.

Excipienți: apă pentru injecții.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Profilaxia și tratamentul anemiei feriprive la animale domestice, în special la purcei și viței.

4. **CONTRAINDICĂȚII**

A nu se administra animalelor cu deficiență de vitamina E și Seleniu.

5. **REAȚII ADVERSE**

Nu sunt date înregistrate. Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

6. **SPECII ȚINTĂ**

Porcine (scroafe, purcei), bovine (viței), ovine (miei), nurci.

7. **POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Se administrează intramuscular profund. Înainte de administrare, flaconul se încălzește în baia de aburi până la 36-38°C.

În scop preventiv (1 administrare per animal / doză):

- Purcei 3-4 zile: 1,5-2 ml;
- Viței 5-6 zile: 8-10 ml;
- Miei 3-5 zile: 2-3 ml;
- Nurci: 0,3-0,5 ml;
- Scroafe (cu 3-4 săptămâni înainte de fătare): 10 ml în administrare unică;

Dacă în gospodărie se înregistrează animale cu simptome de anemie, se administrează curativ în același dozaj de 2-3 ori la interval de 7 zile.

8. **PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Carne și organe – 0 zile.

9. **PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la temperaturi între +3°C și +25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

A se feri de îngheț!

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Administrarea concomitentă cu antacidele micșorează absorbția fierului, cu acidul acetohidroxamic scade eficacitatea ambelor medicamente, iar cu preparate de fier duce la depozitarea ionilor de fier în ficat.

Concomitent cu tetraciclinele scade eficiența acestora; se recomandă administrarea la interval de 2-3 ore. Cu tocoferolul scade eficiența ambelor medicamente. Cu colestiramina scade eficiența fierului. Cu acidul etidronic scade eficiența acidului; se recomandă administrarea la interval de 2 ore.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, după deschiderea flaconului – 24 ore.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă de 10, 20, 50, 100 și 200 ml.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru