

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Vaccin viu liofilizat împotriva tricofitiei bovine

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OAO"BelVitunifarm", 211309, or. Dolja, str.Sovetskaia 26A, or. Vitebsk, reg. Vitebsk, Republica Belarus.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Vaccin viu liofilizat împotriva tricofitiei la bovine.

Substanță activă:

O doză de vaccin conține între 20 și 60 milioane de micronidii viabile de *Trichophyton verrucosum*.

Compoziție:

Tulpină vie atenuată, liofilizată, de *Trichophyton verrucosum* (TF-130 L, VGNKI), cultivată pe mediu nutritiv solid.

Descriere:

Se prezintă sub formă de masă omogenă, deshidratată, atenuată, compactată, de culoare gri-deschis până la crem.

Forma farmaceutică:

Suspensie injectabilă, obținută prin reconstituirea liofilizatului cu diluantul.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pentru prevenirea și tratamentul tricofitiei la bovine.

Imunitatea la animalele vaccinate se instalează la 30 de zile după revaccinare și durează cel puțin 7 ani.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra animalelor cu febră sau cu semne de cașexie.

Nu se administrează vițeilor cu vârsta sub 14 zile și vacilor gestante în ultimul trimestru.

Este interzisă utilizarea vaccinului în exploatațiile nefavorabile pentru boli infecțioase acute până la eradicarea acestora.

5. REACȚII ADVERSE

În urma administrării vaccinului viu liofilizat împotriva tricofitiei bovine, conform instrucțiunilor de utilizare, nu apar reacții adverse sau complicații.

În caz de apariție a complicațiilor, administrarea se întrerupe și se instituie terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru administrare, liofilizatului se diluează cu soluție izotonică de clorură de sodiu.

În acest scop, folosind o seringă sterilă și respectând regulile de asepsie, în flaconul cu liofilizat se adaugă 5 ml de diluant și se agită până la obținerea unei suspensii omogene.

Suspensia obținută se transferă cu seringă într-un flacon steril și se adaugă diluant în proporție de 5 ml pentru fiecare doză de vaccin. Vaccinul astfel diluat este gata pentru administrare.

Exemplu:

Într-un flacon cu 20 de doze de vaccin se introduc 5 ml de diluant steril și se agită până la obținerea unei suspensii omogene.

Suspensia se transferă cu seringă într-un flacon steril (cu volum corespunzător), unde se mai adaugă 95 ml de diluant steril.

Vaccinul se administrează intramuscular, în regiunea lombară.

Locul injectării se tunde și se dezinfectează. Se utilizează ace și seringi sterile, separate pentru fiecare animal.

Dozaj:

Administrare preventivă (două doze la interval de 10–14 zile):

- viței de la 14 zile până la 4 luni: 5 ml;
- viței peste 4 luni și animale adulte: 10 ml.

Administrare curativă (două doze la interval de 10–14 zile):

- viței de la 14 zile până la 4 luni: 10 ml;
- viței peste 4 luni și animale adulte: 20 ml.

Vițeeii de la vârsta de 14 zile, din exploatații favorabile și nefavorabile pentru tricofitie, se vaccinează obligatoriu. Animalele imunizate se monitorizează timp de 30 de zile.

Reacția normală constă în apariția, la locul injectării, a unei cruste cu diametrul de până la 20 mm, care dispare de la sine în 20–25 de zile.

Efectul curativ se observă după 20–30 de zile și se manifestă prin descuamarea crustelor și dispariția leziunilor cutanate. Pentru accelerarea descuamării, pe suprafețele afectate se aplică emoliente, precum untură de pește, vaselină etc.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne – 10 zile. Carcasele obținute înainte de expirarea termenului de așteptare se utilizează conform rezultatelor expertizei sanitar-veterinare.

Lapte – 0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original închis al producătorului, ferit de razele solare directe, la temperaturi de la +2°C până la +10°C. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Se supun vaccinării toți vițeii începând cu vârsta de 14 zile.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Animalele vaccinate în faza de incubație a bolii pot manifesta simptome de tricofitție. Aceste animale se vaccinează suplimentar o dată, cu o doză curativă.

Gruparea și transportul animalelor vaccinate sunt permise fără restricții la o lună de la ultima administrare a vaccinului.

Precauții speciale pentru persoana care administrează medicamentul de uz veterinar:

În timpul manipulării vaccinului viu liofilizat împotriva tricofitiei bovine, este importantă respectarea regulilor generale de igienă personală și a normelor de securitate aplicabile lucrului cu medicamente biologice de uz veterinar.

Persoanelor cu hipersensibilitate li se recomandă evitarea contactului direct cu vaccinul.

În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele oculare, zona se spală abundant cu apă.

În caz de ingestie sau apariție a reacțiilor alergice, se va consulta un medic, prezentând eticheta sau prospectul produsului.

În timpul lucrului este interzis fumatul, precum și consumul de alimente sau băuturi. După finalizarea lucrului, mâinile se spală cu apă și săpun.

Înainte de administrare, vaccinul trebuie diluat cu soluție izotonică sterilă.

După diluare, vaccinul se utilizează în decurs de 8 ore. Vaccinul neutilizat se inactivează prin fierbere timp de 30 de minute.

Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Nu se administrează vacilor gestante în ultimul trimestru de gestație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar:

Nu sunt disponibile date.

Supradozare:

Nu sunt disponibile date.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest vaccin nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de păstrare și transport.

Perioada de valabilitate după reconstituire:

8 ore.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă cu volumul de 10 ml a câte 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 și 40 doze, cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, bd. Dacia 61H; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru