

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Iris

picături oftalmice

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO NVȚ „Agrovezașcita S-P”, 141305, Federația Rusă, reg. Moscova, or. Sergiev Posad, str. Ţentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Iris – picături oftalmice.

În 1 ml se conține:

Substanța activă:

- Gentamicină sulfată - 4 mg.

Excipienți:

- Piro-sulfid de sodiu tehnic - 0,32 mg
- Sare disodică a acidului etilendiaminotetraacetic - 0,01 mg

- Polivinilpirolidona medicală cu masă moleculară medie - 60 mg
- Apă pentru injecții până la 100 ml.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Picături oftalmice Iris se administrează câinilor și pisicilor cu scop curativ și preventiv în caz de conjunctivite acute și cronice, cheratite, cheratoconjunctivite, ulcere și eroziuni ale corneei, meibomite, blefarite și iridociclite (uveite), precum și pentru a reduce riscul de infecții oculare în cazul pătrunderii în ochi a unui corp străin sau altor agenți iritanți.

4. CONTRAINDICAȚII

Se interzice administrarea Picăturilor oftalmice Iris în caz de sensibilitate individuală sporită a animalului la substanța activă și/sau la excipienții medicamentului.

5. REACȚII ADVERSE

În urma administrării medicamentului de uz veterinar conform instrucțiunilor, reacții adverse sau complicații nu au fost înregistrate. În caz de sensibilitate individuală sporită la medicament și apariția reacției alergice, administrarea se stopează și se indică medicamente antihistaminice și simptomatice.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Cu scop curativ, picăturile oftalmice Iris se picură în sacul conjunctival de 4 ori pe zi, timp de 7-10 zile consecutive, în dozele indicate în tabel.

Specia animalului	Număr de picături, necesare pentru o procedură
Câini până la 10 kg	1
Câini de la 10 și mai mult	2
Pisici (indiferent de masă)	1

În cazul proceselor purulente acute, se administrează 3-4 picături în ochiul afectat, iar cu ajutorul unui tampon se îndepărtează puroiul, după care se mai administrează 1-2 picături. Procedura se repetă de 3-4 ori pe zi, în funcție de caz, pentru o perioadă de 5-7 zile.

În profilaxia complicațiilor după extragerea corpurilor străini din ochi și a altor agenți iritanți, medicamentul se picură în sacul conjunctival a câte 1 picătură, de 4 ori pe zi, timp de 3 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu sunt înregistrate reacții adverse sau complicații în urma administrării picăturilor oftalmice Iris conform instrucțiunilor. În cazul omiterii unei doze sau a mai multor doze, tratamentul se reia conform schemei și dozelor de administrare.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

- Nu se administrează animalelor productive.
- Nu au fost înregistrate particularități deosebite la prima administrare sau anularea medicamentului.

Precauții pentru persoana care administrează medicamentul:

- Se recomandă respectarea regulilor de igienă personală și a tehnicii de securitate în utilizarea medicamentului.
- Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu acesta.
- După utilizarea picăturilor, mâinile se spală cu apă și săpun.
- În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele oculare, acestea trebuie spălate din abundență cu apă.
- În cazul apariției reacțiilor alergice sau al ingerării accidentale, este necesar să se adreseze unei instituții medicale, având la îndemână eticheta sau prospectul.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

- Picăturile oftalmice Iris pot fi administrate câinilor și pisicilor în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar:

- Nu există informații despre incompatibilitatea picăturilor oftalmice Iris cu alte medicamente de uz veterinar sau adaosuri nutritive.

Supradozare:

- Nu au fost înregistrate simptome de supradozare la animale.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – 10 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Medicamentul de uz veterinar este disponibil în următoarele forme de ambalare:

- Pipete-picurătoare din polimer, cu volume de 1 ml, 3 ml și 5 ml.
- Flacoane-picurători din polimer, cu volume de 10 ml, 15 ml, 20 ml și 30 ml, închise cu capace filetate din polimer cu sigiliu.
- Flacoane din sticlă, închise cu dopuri din cauciuc și capace din aluminiu.

Toate aceste ambalaje sunt livrate în cutii individuale din carton, care includ prospectele de utilizare.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru