

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ciprovet

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO NVȚ „Agrovezașcita S-P”, 141305, Federația Rusă, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ciprovet – picături oftalmice.

În 1 ml se conține:

Substanța activă:

- Ciprofloxacin hidroclohid - 4,5 mg

Excipienți:

- Clorură de benalconiu - 0,05 mg
- Trilon B - 0,08 mg
- Apă pentru injecții până la 100 ml.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ciprovet picături oftalmice se indică câinilor și pisicilor în următoarele cazuri:

- În tratamentul afecțiunilor grave și cronice ale ochilor: conjunctivite acute și cronice, cheratoconjunctivite, cheratite, ulcere corneene, iridociclite septice, blefarite.
- Pentru reducerea riscului apariției infecțiilor oculare în urma traumelor, pătrunderii corpurilor străine și în chirurgia oftalmologică, atât în perioadele preoperatorie, cât și postoperatorie.

4. CONTRAINDICAȚII

Se interzice administrarea medicamentului în caz de sensibilitate individuală sporită a animalului la fluorochinolone.

5. REACȚII ADVERSE

În urma administrării medicamentului conform instrucțiunii, reacții adverse și complicații nu au fost înregistrate. În rare cazuri, medicamentul poate provoca o ușoară senzație de durere, hiperemie conjunctivală, prurit sau lăcrimare, care dispar spontan în aproximativ 5 minute.

În cazul apariției unei reacții alergice (persistența sau intensificarea hiperemiei conjunctivale), administrarea medicamentului trebuie oprită, iar animalului i se vor administra antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Ciprovet picături oftalmice se administrează în cavitatea conjunctivală a ochiului afectat:

- **Pisicilor:** 1 picătură de 4 ori pe zi.
- **Câinilor:** 1-2 picături de 4 ori pe zi.

Tratamentul durează 7-14 zile, până la dispariția simptomelor.

În cazul eliminărilor purulente sau sero-purulente, se recomandă igienizarea prealabilă a ochiului prin aplicarea a 3-4 picături de medicament, urmată de ștergerea cu un tampon steril de tifon. După igienizare, se picură 1-2 picături și se continuă tratamentul.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

A nu se utiliza la pisicuțe și căței cu vârsta sub 7 zile.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Ciprovet picături oftalmice se administrează cu precauție la animalele cu ateroscleroză a vaselor cerebrale și dereglări ale circulației cerebrale.

Nu se administrează animalelor productive.

Nu au fost înregistrate particularități deosebite la prima administrare a medicamentului sau la întreruperea utilizării acestuia.

Se recomandă respectarea intervalelor și dozelor pentru a nu diminua eficiența terapeutică.

La omiterea administrării uneia sau mai multor doze, tratamentul se reia conform schemei și dozelor de administrare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează:

În timpul lucrului cu picăturile oftalmice Ciprovet, se recomandă respectarea regulilor de igienă personală și a tehnicilor de securitate prevăzute pentru manipularea medicamentelor de uz veterinar.

Este interzis fumatul și consumul de băuturi sau alimente.

La terminarea lucrului, mâinile se spală cu apă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele oculare, acestea se spală abundant cu apă.

Persoanelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului li se recomandă evitarea contactului direct cu medicamentul de uz veterinar.

În caz de ingerare sau apariția reacțiilor alergice, este necesar să vă adresați unei instituții medicale (având la dumneavoastră eticheta sau prospectul de utilizare).

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Posibilitatea administrării picăturilor oftalmice Ciprovet la câini și pisici în perioada de gestație și lactație, precum și descendenților, va fi determinată de medicul veterinar responsabil, pe baza evaluării raportului risc/beneficiu în urma administrării medicamentului.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Ciprovet picături oftalmice este incompatibil cu soluțiile medicamentoase având un pH de 3-4, care sunt instabile din punct de vedere fizic sau chimic.

Când se utilizează alte medicamente oftalmice, intervalul dintre administrări trebuie să fie de cel puțin 5 minute.

Supradozare:

Simptome de supradozare la animale nu au fost înregistrate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – 30 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Ciprovet picături oftalmice sunt ambalate în flacoane de 5, 10 și 20 ml, din sticlă, închise cu capace din polimer sau prevăzute cu dopuri din cauciuc și capace din aluminiu. Ambalajul secundar constă în cutii de carton și este însoțit de instrucțiuni de administrare.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru