

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Fypryst 50 mg - pentru pisici

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto
Slovenia

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Fypryst 50 mg – soluție spot-on pentru pisici.

1 pipetă (0,5 ml) conține:

Substanță activă:

- Fipronil 50 mg

Excipienți:

- Butilhidroxitoluen (E321)
- Butilhidroxianisol (E320)
- Etanol (96%)

- Polisorbat 80
- Povidonă K25
- Dietilen glicol-monoetileter.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

- Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides felis*) și căpușe (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) la pisici.
- Tratamentul și controlul dermatitelor alergice produse de înțepăturile puricilor (FAD) la pisici.
- Prevenirea și tratamentul infestațiilor cu păduchi hematofagi *Felicola subrostratus* la pisici.

Acest produs este utilizat pentru gestionarea și prevenirea infestațiilor parazitare la pisici, inclusiv purici, căpușe și păduchi.

4. CONTRAINDICAȚII

- Nu se administrează la pisici cu vârsta mai mică de 8 săptămâni sau cu greutatea corporală mai mică de 1 kg.
- Nu se administrează la animale bolnave sau aflate în convalescență.
- Nu se administrează în cazul sensibilității cunoscute la fipronil sau la oricare dintre excipienți.
- Nu se administrează la alte specii decât cele specificate în instrucțiuni.
- Evitați utilizarea produsului la pisici cu boli dermatologice severe sau afecțiuni ale pielii care pot interfera cu absorbția corectă a medicamentului.

5. REACȚII ADVERSE

- Dacă animalele se ling, poate apărea hipersalivație de scurtă durată, cauzată în principal de excipienți.
- Reacții pasagere ale pielii la locul aplicării (decolorare, căderea părului, prurit, eritem).
- Prurit general cu alopecie.
- În mod excepțional, pot apărea simptome neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, nervozitate), hipersalivație sau vomă.

Precauții:

- Evitați supradozarea.
- Dacă apar reacții grave sau alte efecte neprevăzute, contactați medicul veterinar..

6. SPECII ŢINTĂ

Pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

- Aplicaţi conţinutul unei pipete cu doză unică de 0,5 ml pe piele, între spete.

Calea de administrare:

- Utilizare spot-on.

Metoda de administrare:

1. Scoateţi o pipetă din ambalaj.
2. Țineți pipeta în poziție verticală cu vârful în sus și deșurubați capacul.
3. Cu celălalt capăt al dopului îndepărtat, perforați sigiliul pipetei.
4. Îndepărtați părul animalului de pe linia mediană dintre spete pentru a face pielea vizibilă.
5. Puneți vârful pipetei pe piele și presați tubul de mai multe ori pentru a-l goli direct pe piele.

O doză va asigura protecția împotriva infestării cu purici pe o perioadă de 5 săptămâni.

Produsul este eficient împotriva căpușelor timp de 2 săptămâni.

În absența studiilor pentru demonstrarea siguranței produsului, intervalul minim între aplicări este de 4 săptămâni.

Evitați contactul produsului cu ochii animalului.

Căpușele de pe animale trebuie îndepărtate înainte de utilizarea produsului pentru a micșora riscul bolilor transmisibile.

Este important să vă asigurați că aplicarea produsului se face într-un loc ferit unde animalul nu se poate linge și trebuie evitat ca animalele să se lingă unele pe altele. Nu sunt informații valabile cu privire la eficacitatea produsului după baie/șamponare a pisicilor. Cu toate acestea, bazându-ne pe informații cu privire la eficacitatea produsului la câini spălați cu șampon, îmbăierea pisicilor nu se recomandă timp de două zile după aplicarea produsului.

Sporadic, se pot atașa căpușe. Din acest motiv, transmiterea bolilor infecțioase prin intermediul căpușelor nu poate fi exclusă în totalitate, dacă condițiile sunt nefavorabile. De regulă, căpușele vor muri și vor cădea de pe gazdă în decurs de 24-48 de ore după infestare, fără a se hrăni cu sângele animalului.

Atașarea unei singure căpușe după tratament nu poate fi exclusă. Astfel, este recomandată îndepărtarea căpușelor deja atașate pe pisici, în momentul tratamentului, pentru a preveni hrănirea acestora.

Puricii animalelor de companie invadează frecvent culcușul acestora, acolo unde animalele dorm și se odihnesc, locuri care trebuie tratate în mod regulat cu insecticide adecvate și curățate cu ajutorul unui aspirator în cazul infestațiilor masive și în momentul aplicării măsurilor de prevenție.

Produsul Fypryst soluție spot-on poate fi aplicat femelelor destinate reproducției și femelelor gestante, precum și femelelor în lactație.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Produsul poate cauza iritarea membranelor mucoase și a ochilor. Astfel, evitați contactul produsului cu gura și ochii.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau alcool trebuie să evite intrarea în contact cu produsul medicinal veterinar. Evitați contactul direct al mâinii cu produsul. În caz de contact accidental, spălați mâinile cu apă și săpun.

În caz de contact accidental cu ochii, spălați din abundență cu apă curată.

Spălați mâinile după utilizare.

Nu puneți mâna pe animalele tratate și nu lăsați copiii să se joace cu acestea până ce locul de aplicare al produsului nu s-a uscat. De aceea, nu se recomandă aplicarea tratamentului în timpul zilei, ci seara înainte de culcare, iar animalelor nu li se va permite să doarmă cu proprietarii sau, mai ales, cu copiii.

Nu fumați, nu beți și nu mâncați în timp ce aplicați produsul.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

36 luni din data producerii, de la prima deschidere – a se folosi imediat.
A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pipetă de 0,5 ml cu doză unică de soluție spot-on, împachetată în pungă triplă.
Cutii cu 1, 3, 6, 10 și 20 pipete.

*Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru