

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ASCACID 2,5%

suspensie orală

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO"Biovet", 4550 Bulgaria, or.Peștera, str. Piotr Rakov 39 Reprezentanța
OOO"Huvepharma "(Bulgaria) în or. Moscova; 115191, or.Moscova, pr. 4 Roscinskii,
c. 19

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

ASCACID 2,5%

25 mg/ml suspensie orală

1 ml suspensie orală conține

- **Substanța activă:** Albendazol 25 mg

- **Excipienți:** Monopropilenglicol, Carboximetilceluloză sodică, Benzoat de sodiu, Apă demineralizată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Produsul este indicat la ovine în tratamentul nematodozelor gastrointestinale și

pulmonare (*Oesophagostomum spp.*, *Nematodirus spp.*, *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Dictyocaulus spp.*), al trematodozelor (*Fasciola spp.*) și al cestodozelor (*Moniezia spp.*).

4. CONTRAINDICAȚII

Datorită efectului potențial teratogen și embriotoxic, nu se administrează în prima lună de gestație.

5. REACȚII ADVERSE

Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. Dacă observați efecte severe sau alte efecte nemenționate în acest prospect, anunțați de urgență medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZĂ PRESCRISĂ

ASCACID 2,5% se administrează oral cu seringă sau cu un alt dispozitiv gradat pentru administrarea suspensiilor orale la animale, în doză unică de 7,5 mg albendazol/kg greutate corporală (15 ml ASCACID 2,5% / 50 kg greutate corporală) la ovine.

În caz de reinfestare, tratamentul se repetă după 3 luni.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe: – 7 zile

Lapte: – 3 zile

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C. A se feri de îngheț. A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Utilizare în perioada de gestație, lactație

Datorită efectului potențial teratogen și embriotoxic, nu se administrează în prima lună de gestație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se asociază cu cimetidină și praziquantel, care reduc absorbția albendazolului prin modificarea pH-ului în rumen.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Depășirea dozei de până la 20 de ori nu determină reacții adverse.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

Este indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polietilenă de înaltă densitate de 100 ml, 500 ml și 1000 ml, cu capac prevăzut cu sigiliu.

- Cutie de carton × 30 flacoane × 100 ml
- Cutie de carton × 20 flacoane × 500 ml
- Cutie de carton × 10 flacoane × 1000 ml

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru