

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Pix Fagi

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Bioveta, a. s., Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane
Czech Republic

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Pix Fagi – spray pentru uz extern.

1 g de medicament conține:

Substanță activă:

- Fagi pix (gudron de fag) - 200 mg

Excipienți:

- Acetat etilic
- Etanol denaturant cu petrol.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Maladii ale copitei și ghearelor la care este indicat tratamentul cu gudron (putregaiul țesutului cornos, panaritiu superficial etc.), intervenții chirurgicale ale copitei, tratamentul defectelor copitei, tratament după tunderea regulată a copitelor, fixarea pansamentelor copitelor și bandajelor de acoperire.

Dermatomicoze la animale, în special în stadiile incipiente sau în timpul terapiei secvențiale, când proprietățile de uscare ale gudronului se manifestă favorabil.

Tratamentul dermatomicozelor:

- Psoriazis vulgar
- Dermatita atopică infectată cu lichen
- Lichen simplex cronic
- Lichen plan
- Dermatita seboreică

Înlocuirea bandajului țesut: după evaporarea solventului se formează o peliculă pe suprafață maro antiadezivă, care respinge apa. Gudronul are proprietăți favorabile de uscare.

4. CONTRAINDICAȚII

Exeme acute exudative.

A nu se utiliza în tratamentul pisicilor.

Dermatită fototoxică, infecții severe ale pielii, lupus eritematos, aplicare pe organele genitale externe.

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanța activă.

5. REACȚII ADVERSE

Gudronul și uleiurile de gudron pot provoca iritații ale pielii și nu pot fi aplicate pe pielea inflamată și deteriorată.

Arsuri și eritem la locul de aplicare, fototoxicitate, foliculită de gudron, risc de afectare a rinichilor la tratarea unor zone patologice mari.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Animalele nedestinate consumului uman, cu excepția felinelor.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se aplică prin pulverizare de la o distanță de 15-20 cm, evitând pulverizarea inutilă. În tratamentul ghearelor și copitelor, de preferință, să se creeze 2-3 straturi (se aplică următorul strat numai după ce cel anterior s-a uscat complet).

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este destinat animalelor de la care se obțin alimente pentru consum uman.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Gudronul conține substanțe fototoxice, hipersensibilitatea pielii la lumină se adaugă efectului terapeutic.

Cu toate acestea, se recomandă protejarea zonelor pielii tratate de expunerea necontrolată la radiațiile solare. Gudronul este, de asemenea, nefrotoxic, de aceea este necesar să se monitorizeze urina.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când utilizați medicamentul de uz veterinar, nu mâncați, beți sau fumați.

Spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun după utilizarea medicamentului de uz veterinar.

Folosiți mănuși de protecție atunci când manipulați medicamentul de uz veterinar.

Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu pielea, curățați zonele contaminate cu alcool, clătiți cu apă și tratați cu o cremă protectoare pentru mâini. În caz de iritație persistentă, solicitați sfatul medicului.

În caz de contact cu ochii, clătiți cu multă apă de băut și solicitați sfatul medicului.

Medicamentul de uz veterinar este combustibil de clasa 1! Când utilizați, nu fumați.
Nu pulverizați pe foc deschis sau pe orice material incandescent.
Evitați inhalarea medicamentului de uz veterinar.
Utilizați spray-ul numai în aer liber sau în zone bine ventilate.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Utilizarea medicamentului de uz veterinar nu afectează starea generală de sănătate a animalelor în timpul sarcinii, datorită ariei de aplicare relativ mici.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare:

Datorită modului de administrare și indicațiilor, o supradoză de medicament este imposibilă.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

160 g - în flacoane HDPE din plastic rezistent de 250 ml, dotate cu pompă mecanică.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru