

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Defensor 3

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1048 Louvain-la-Neuve
Belgia

Numele și adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

Zoetis Inc., Kalamazoo, MI 49007
SUA

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Defensor 3 – Vaccin antirabic cu virus inactivat

Substanța activă:

Fiecare doză (1 ml) de Defensor 3 conține:

Virus rabic inactivat, tulpina PV-Paris/BHK/purif. Pass 3, SVR-289

Minimum: 0,96 RP

Excipienți:

Gentamicină ≤ 3 μg/ml

Merthiolat ≤ 0,01% W/V

Adjuvant:

Hidroxid de aluminiu 2% Al₂O₃ — 10 ± 1% V/V.

3. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, dihori, taurine și ovine.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Defensor 3 este recomandat pentru imunizarea împotriva rabiei a câinilor, pisicilor, dihorilor, taurinelor și ovinelor sănătoase în vârstă de peste 3 luni.

5. CONTRAINDICAȚII

Acest medicament este eficace dacă este administrat animalelor sănătoase. Un răspuns imun protector poate să nu fie obținut dacă animalele vaccinate sunt în perioada de incubație a unei boli infecțioase, sunt malnutrite sau parazitare, stresate din cauza condițiilor de mediu în care trăiesc sau sunt imunosupresate.

6. REACȚII ADVERSE

Nu s-a raportat apariția de efecte indezirabile atunci când vaccinul a fost administrat conform recomandărilor.

La fel ca și în cazul altor vaccinuri, după utilizare poate apărea o reacție de tip anafilactic. Antidotul inițial este epinefrina, după care trebuie instituită o terapie de susținere.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de folosire, se agită fiola și conținutul se injectează subcutanat sau intramuscular.

Câini și pisici:

Indicații generale: Se va administra aseptice 1 ml subcutanat. Câinii pot fi vaccinați subcutanat sau intramuscular.

Vaccinarea primară: Se va administra o singură doză de 1 ml la câinii și pisicile în vârstă de 3 luni sau mai mult. O nouă doză trebuie administrată 1 an mai târziu.

Revaccinarea: Se recomandă revaccinarea la fiecare 3 ani cu o singură doză.

Dihori:

Indicații generale: Se va administra aseptically 1 ml subcutanat.

Vaccinarea primară: Se va administra o singură doză de 1 ml la animalele în vârstă de 3 luni sau mai mult. O nouă doză trebuie administrată 1 an mai târziu.

Revaccinarea: Se recomandă revaccinarea anuală cu o singură doză.

Taurine și ovine:

Indicații generale: Se va administra aseptically 2 ml intramuscular.

Vaccinarea primară: Se va administra o singură doză de 2 ml la vacile și oile sănătoase în vârstă de 3 luni sau mai mult. O nouă doză trebuie administrată un an mai târziu.

Revaccinarea: Se recomandă revaccinarea anuală cu o singură doză.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu se vor vaccina animalele cu 21 de zile înainte de sacrificare.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se depozita și transporta la temperaturi de refrigerare (+2° – +7°C).

A se feri de lumină.

A nu se congela.

A nu se folosi după data de expirare înscrisă pe etichetă.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Vaccinați doar animalele sănătoase.

Personalul implicat și cei care participă la vaccinarea puilor trebuie să respecte principiile generale de igienă.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar, așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane de plastic de 1, 10 și 25 doze, prevăzute cu un dop de cauciuc, sigilat cu o bandă de aluminiu.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, bd. Dacia 61H; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru