

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### Creolină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

AO Uzina „Veterinarnîe Preparatî“, 601508, Regiunea Vladimir, or. Gusi-Hrustalinîi,  
Str. Himzavodskaia 2  
Tel: (49241) 2-33-65

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Creolină – fără fenoli din cărbune de pământ.

Compoziție.

Un ml de preparat conține:

- **Substanță activă:**
- Naftalină – 115 mg

**- Excipienți:**

- Colofoniu
- Ihtiol sodic
- Neonol
- Apă (până la 1 ml).

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

- Creolină fără fenoli din cărbune de pământ manifestă acțiune acaricidă față de *Psoroptes equi* (varietatea *ovis*) la caprine și ovine, având o acțiune reziduală îndelungată pe blană și piele.
- Posedă acțiune antimicrobiană față de:
  - Bacterii Gram-pozitive și Gram-negative, inclusiv agenții patogeni responsabili de:
    - Necrobacterioza bovinelor (*Fusobacterium necrophorum*);
    - Pododermatita infecțioasă la oi (*Dichelobacter nodosus*);
    - Fungi din familia *Candida*.
  - Se recomandă, de asemenea, pentru dezinfectarea:
    - Suprafețelor din hale industriale și încăperi auxiliare;
    - Vehiculelor utilizate pentru transportarea animalelor.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

- Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele preparatului.
- Se interzice prelucrarea:
  - Animalelor în lactație;
  - Animalelor bolnave de boli infecțioase;
  - Animalelor slăbite sau cașexice.

### **5. REACȚII ADVERSE**

Nu se cunosc.

### **6. SPECII ȚINTĂ**

Bovine, ovine, caprine (se utilizează și ca substanță pentru dizinfecție).

### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

#### **Tratamentul psoroptozei la oi și capre**

- **Condiții:** Pe timp uscat, la o temperatură a aerului peste 20°C; în perioada rece, în încăperi încălzite.

- **Metodă:** Îmbăiere în emulsie de 2% (2 kg Creolină fără fenoli din cărbune de pământ / 100 l apă sau 20 kg / 1000 l apă) cu scufundarea capului.
- **Temperatura emulsiei:** Minimum 20°C.
- **Timp de expunere:** 2 minute.
- **Frecvență:**
  - Scop curativ: De 2 ori, cu un interval de 10 zile.
  - Scop profilactic: O singură dată.
- **Pregătirea animalelor:**
  - Se lasă să se odihnească și se oprește hrănirea cu 4-5 ore înainte de procedură.
- **Prepararea soluției:**
  - Se amestecă bine Creolina fără fenoli în apa necesară, cu puțin timp înainte de utilizare.
  - Reumplerea băii: După îmbăierea a 200 de oi, se adaugă preparat pentru a menține concentrația de 2%.
- **Post-tratament:**
  - Animalele se țin 15 minute pe un teren amenajat pentru scurgerea emulsiei, apoi se duc pe pășune.
  - În perioada rece, se usucă în încăpere.
- **Întreținerea băii:** Dacă emulsia se impurifică, baia se golește, se curăță și se umple din nou. Reziduurile se scurg într-un rezervor cu pereți de beton pentru a preveni poluarea mediului.
- **Testare prealabilă:** Înainte de prelucrarea în masă, se testează pe 10-15 animale; dacă nu apar simptome de intoxicație în 2 zile, se tratează întregul șeptel.

### **Profilaxia pododermatitei infecțioase la oi și capre și a necrobacteriozei la bovine**

- **Metodă:** Trecerea animalelor sănătoase prin baia dezinfectantă cu emulsie de 3% (3 kg Creolină fără fenoli / 100 l apă).
- **Frecvență:** De 2 ori, cu un interval de 10-15 zile.
- **Timp de contact:** 2-3 minute.
- **Adâncimea băii:** Minimum 15 cm pentru scufundarea membrului.
- **Condiții:** În aer liber (perioada caldă) sau în adăposturi (perioada rece).
- **Eficiență maximă:** În gospodării afectate, se combină cu vaccinarea și alte măsuri sanitare-veterinare.

### **Dezinfecția suprafețelor**

- **Profilactică:**
  - Emulsie: 3% (3 kg / 100 l apă).

- Raport: 0,5 l/m<sup>2</sup>.
- Timp de expunere: 3 ore.
- Suprafețe: Hale industriale, auxiliare, ședuri pentru iepuri, depozite, săli de furaje, vaccinare, jupuire, vehicule și vagoane (metalice).
- **De necesitate curentă (împotriva *E. coli* și stafilococi):**
  - Emulsie: 3,5% (3,5 kg / 100 l apă).
  - Raport: 0,5 l/m<sup>2</sup>.
  - Timp de expunere: 3 ore.
- **Metodă:** Aspersare cu echipamente (DUK-1, DUK-2, AVD-1, UDP-M, LSD-3M, LSD-EP) în absența animalelor, produselor de abator și alimentare.
- **Pregătire:** Curățire mecanică și hidromecanică a suprafețelor pentru a elimina impuritățile organice care reduc eficiența.
- **Post-dezinfecție:**
  - Spălare abundentă cu apă a hrănilor, adăpătorilor, ședurilor și suprafețelor accesibile animalelor sau produselor.
  - Aerisire (ferestre, uși deschise, ventilație pornită) până la dispariția mirosului specific.

### **Recomandări privind administrarea corectă**

- **Întreținerea băii:** Dacă emulsia se murdărește, baia se golește, se curăță și se reumple. Reziduurile se depozitează în rezervoare betonate pentru a evita poluarea mediului.
- **Testare prealabilă:** Fiecare serie se testează pe 10-15 animale; dacă nu apar semne de intoxicație în 2 zile, se tratează tot șeptelul.

### **Precauții speciale pentru persoana care administrează produsul**

- Respectați regulile de igienă personală și tehnicile de siguranță prevăzute pentru medicamentele veterinare.
- Este interzis fumatul, consumul de alimente și băuturi în timpul manipulării.
- **După utilizare:** Spălați cizmele, mănușile, vasele și utilajul cu apă; spălați fața și mâinile cu apă și săpun.
- Personalul nu intră în încăperi în timpul prelucrărilor cu aerosol.
- **Îngerare accidentală:** Administrați câteva pahare de apă caldă cu 10-15 tablete de cărbune activat (zdrobite) sau alt absorbant, apoi un laxativ salin; consultați imediat o instituție medicală cu eticheta/instrucțiunile.
- **Contact cu pielea:** Spălați cu apă și săpun abundent.
- **Contact cu ochii:** Spălați cu apă și soluție de bicarbonat de sodiu 2%.

- Consultați un medic dacă este necesar.
- **Ambalaje:** Nu reutilizați în scopuri casnice.

## 8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

- Sacrificarea animalelor pentru consum uman este permisă nu mai devreme de 24 de ore de la ultima prelucrare cu Creolină fără fenoli din cărbune de pământ.
- Carcasele obținute înainte de expirarea acestui termen se utilizează în hrana animalelor de blană sau pentru producerea făinii din carne și oase.

## 9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C -25°C la + 40°C, în locuri inaccesibile copiilor.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## 11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

### Precauții generale

- În timpul pregătirii și utilizării soluțiilor de Creolină fără fenoli, este obligatoriu să se respecte strict regulile de precauție și protecție personală.

### Alte precauții

#### - **Tratamentul animalelor:**

- Se efectuează individual, cu separarea animalelor în spații pregătite în prealabil.

#### - **Dezinfecția încăperilor:**

- Se realizează prin aspersare fină a suprafețelor și a echipamentului tehnologic, în absența animalelor, a produselor de abator și a produselor alimentare.

## 12. PERIOADA DE VALABILITATE

5 ani din data producerii, de la prima deschidere – conform etichetei în ambalajul original.

Termenul de valabilitate după diluare – 4 ore.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

- Flacoane de polimer: 0,1 kg
- Sticle de polimer: 0,5 kg și 1,0 kg
- Canistre din polimer: 5 kg și 21,5 kg.

### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL" Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)