

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Amoxigard

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO "NITA-FARM", Federația Rusă, 410010, or. Saratov, str. Osipov V.
Tel.: +7 452-338-600

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Amoxigard – suspensie injectabilă.

1 ml conține:

- **Substanțe active:**

- Amoxicilină (sub formă de trihidrat): 140 mg
- Acid clavulanic (sub formă de potasiu clavulanat): 35 mg

- **Excipienți:**

- Butilhidroxitoluol: 2 mg
- Propilenglicol dicaprilat/dicaprat: până la 1 ml.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se indică animalelor cu scop curativ în cazul bolilor de etiologie bacteriană, agenții patogeni ai cărora sunt sensibili la combinația amoxicilină și acid clavulanic:

- Bovine:

- Tratatamentul bolilor respiratorii
- Boli ginecologice (metrite și mastite)
- Boli chirurgicale, inclusiv infecții ale pielii și țesuturilor moi (abscese, flegmoane, furuncule).

- Porcine:

- Tratatamentul bolilor infecțioase ale organelor respiratorii
- Colibacterioză
- Infecții puerperale la scroafe.

- Câini și pisici:

- Tratatamentul bolilor organelor respiratorii
- Infecții urologice
- Boli infecțioase ale pielii și țesuturilor moi (abscese, piodermă, inflamația glandelor perianale, gingivite).

4. CONTRAINDICAȚII

- Nu se administrează animalelor în caz de hipersensibilitate la substanțele active, excipienți sau la antibiotice β -lactamice.
- Nu se administrează animalelor în caz de afecțiuni pronunțate hepatice și/sau renale.

5. REACȚII ADVERSE

- La administrarea medicamentului Amoxigard, în conformitate cu instrucțiunile prescrise, reacții adverse și complicații, de regulă, nu apar.
- La unele animale, în locul injectării, poate apărea o reacție locală sub formă de edem, care dispare în mod spontan în 1-2 zile.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, porcine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

- Se administrează în doză de 1 ml (140 mg amoxicilină și 35 mg acid clavulanic) la 20 kg greutate corporală a animalului.
- Se administrează o dată pe zi:
 - Câinilor și pisicilor: intramuscular sau subcutan
 - Bovinelor și porcinelor: numai intramuscular
- Durata unui curs de tratament: 3 până la 5 zile.

Recomandări privind administrarea corectă

- Înainte de administrare, flaconul se agită bine până la obținerea unei suspensii omogenizate.
- Locul injectării, după administrare, se recomandă a fi masat.
- Pentru injectarea medicamentului se utilizează doar seringi și ace uscate.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Perioada de așteptare

- Carne:
- Bovine: 42 zile
- Porcine: 31 zile
- Lapte: 108 ore

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă

- Tineretului, medicamentul se administrează în caz de necesitate doar sub supravegherea medicului veterinar, în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc.

Precauții speciale pentru utilizare

- Combinația de amoxicilină/acid clavulanic trebuie utilizată numai pe baza testelor de susceptibilitate.
- La utilizarea medicamentului de uz veterinar, trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.
- Utilizarea medicamentului în afara instrucțiunilor prevăzute în prospect poate crește prevalența bacteriilor rezistente la amoxicilină/acid clavulanic și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte peniciline, datorită potențialului de rezistență încrucișată.
- Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima administrare sau la anularea lui nu au fost înregistrate.
- Omiterea unei sau mai multor administrări duce la diminuarea eficienței terapeutice. În caz de omitere a unui sau mai multor dozaje, administrarea se reia în același dozaj, conform aceleiași scheme. Se interzice administrarea dozajului dublu pentru compensarea celui omis.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale

- În timpul manipulării medicamentului de uz veterinar, este important să se respecte regulile generale de igienă personală și tehnicile de securitate prevăzute pentru lucrul cu medicamentele de uz veterinar.
- Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau excipienți trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.
- În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul băuturilor și produselor alimentare.
- Spălați-vă mâinile după manipularea medicamentului de uz veterinar.
- În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, acestea se spală din abundență cu apă.
- În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice, este necesar să vă adresați unei instituții medicale (având la sine eticheta sau prospectul de utilizare).

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

- Femelelor gestante și în lactație, medicamentul se administrează în caz de necesitate doar sub supravegherea medicului veterinar, în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

- Nu se recomandă administrarea Amoxigard concomitent cu tiamfenicol, cloramfenicol, antibiotice din grupa penicilinelor, cefalosporine și fluorochinolone, sau amestecarea acestuia într-o seringă cu alte medicamente de uz veterinar.

Supradozare

- În caz de supradozare la animale, se pot observa:
 - Scăderea poftei de mâncare
 - Stare depresivă
 - Reacție inflamatoare în locul injectării

Incompatibilități

- A nu se amesteca cu niciun alt medicament de uz veterinar.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 3 luni.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Amoxigard se produce ambalat în:

- Flacoane din sticlă de 20, 50, 100, 250 ml, cu dopuri din cauciuc și capace din aluminiu
- Flacoane din polimer cu capace filetate cu control pentru prima deschidere
- Flacoanele se ambalează în cutii din carton.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru