

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bars classic

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR. Deținătorul certificatului de înregistrare:

OOO «NVȚ Agrovetzașcita», Federația Rusă, 129329, Moscova, str. Igarsckii proezd nr. 4/2

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

OOO "AVZ S-P", Rusia, 141305, Moscova, or. Serghiev Posad, str. Ţentralinaia 1/11

Tel/fax: (495) 721-49-81

<http://www.avzvet.ru>

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

BARS Clasic Picături Contra Purici și Căpușe pentru Pisici

BARS Clasic Picături Contra Purici și Căpușe pentru Câini

Picături pentru uz extern.

Soluție transparentă uleioasă, de culoare de la gălbui la galben.

BARS Clasic Picături Contra Purici și Căpușe pentru Pisici:

Substanța activă:

- Fipronil - 10 mg/ml
- Diflubenzuron - 1 mg/ml
- Dicarboximid (MGK-264) - 1 mg/ml

BARS Clasic Picături Contra Purici și Căpușe pentru Câini:

Substanța activă:

- Fipronil - 50 mg/ml
- Diflubenzuron - 1 mg/ml
- Dicarboximid (MGK-264) - 5 mg/ml

Excipienți:

- Alcool izopropilic
- Polivinilpirolidon
- Tvin-80
- Polietilenglicol 400

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

BARS Clasic Picături Contra Purici și Căpușe se indică câinilor și pisicilor în tratamentul și profilaxia entomozelor (purici, păduchi malofagi și hematofagi), sarcoptozei, notoedrozei, otodectozei, heiletielozei și infestării cu căpușe ixodide.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitatea individual sporită la substanțele active a medicamentului.

Nu se aplică animalelor bolnave de boli infecțioase, slăbite și în coalescență, cățelușilor și pisoișilor cu vârsta mai mică de 8 săptămâni, câinilor cu greutatea corporală mai mică de 2 kg.

Este contraindicat de a utiliza acest medicament auricular în cazul perforării de timpan.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform indicațiilor, reacții adverse, de regulă, nu apar.

În caz de sensibilitate individuală sporită a animalului la substanțele active ale medicamentului și apariția reacțiilor adverse (salivație abundentă, lăcrimare, vomă), tratamentul se stopează, iar medicamentul se spală cu apă și săpun.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

BARS clasic contra purici și căpușe se aplică o singură dată, prin picurare, îndepărtând blana, pe pielea uscată, intactă, în câteva puncte, pe grumaz și la baza craniului (în locuri unde animalul nu ajunge să se lingă).

Ținând cont de specie și greutatea corporală a animalului, se alege ambalajul de volumul necesar sau combinația acestora și se aplică în dozele recomandate din tabel.

Greutatea animalului	Volumul medimamentului în pipetă, ml	Doza de medicament, ml per animal	Număr de pipete, necesare pentru tratare, buc	
			Volum corespunzător	Volum 1,4 ml
Câini				
De la 2 la 10 kg	1,4	1,4	1	
De la 10 la 20 kg	2,8	2,8	1	2
Pisici				
Până la 1 kg	1,0	0,3 (10 picături)	1	
De la 1 la 3 kg	1,0	0,6 (20 picături)	1	
> 3	1,0	1,0	1	

Pentru tratamentul câinilor cu greutatea corporală mai mare de 20 kg, medicamentul se administrează în raport de 1,4 ml la 10 kg greutate corporală.

Pentru combaterea căpușilor ixodide de pe suprafața corpului animalului, se aplică 1 picătură de medicament direct pe căpușă și pe locul fixării acesteia de piele. Dacă în 20-30 minute căpușa nu se desprinde singură, aceasta se extrage cu o pensetă și se nimicește cu grijă.

În tratamentul otodectozei, mai întâi se îndepărtează exudatul, cerumenul și crustele din pavilionul urechii și canalul auditiv. Apoi, în fiecare ureche se picură câte 4-6 picături de medicament. Pentru distribuirea uniformă a medicamentului, pavilionul

urechii se masează bine la baza acestuia. Restul medicamentului din pipetă se aplică pe pielea de la grumaz. În caz de otodectoză cronică asociată cu otită, se vor folosi remedii antibacteriene și antiinflamatorii, iar tratamentele auriculare cu BARS clasic se vor repeta la 7-10 zile.

Medicamentul se picură în ambele urechi, chiar și în cazurile în care doar una dintre urechi este afectată de otodectoză.

După aplicarea medicamentului în urechi, este necesar să se fixeze capul câinelui timp de câteva minute pentru a preveni scuturarea capului și împrăștierea medicamentului.

Recomandări privind administrarea corectă:

Tratamentul se va repeta conform indicațiilor, dar nu mai des de o aplicare pe lună.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Acest medicament nu este indicat pentru utilizare animalelor de la care se obțin alimente.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu au fost înregistrate particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima administrare sau la anularea acestuia.

În cazul administrării repetate, se recomandă respectarea termenilor recomandați pentru insectoacaricide pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei aplicări, tratamentul se va relua cu aceeași doză conform aceleași scheme.

Pentru a obține un efect optim de protecție, tratamentele trebuie efectuate cu cel puțin 24 de ore înainte de plimbarea câinilor în locuri unde există posibilitatea habitatului paraziților.

Pentru a preveni reinfestarea cu purici, se recomandă schimbarea sau prelucrarea așternutului animalelor și a podelei din încăperi cu insecticide, conform instrucțiunilor acestora.

Nu se recomandă scăldatul animalului timp de 3 zile înainte sau după tratament. Se recomandă evitarea pătrunderii medicamentului pe mucoasele oculare ale animalului.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu BARS clasic picături contra purici și căpușe, este important să se respecte regulile de igienă personală și tehnicile de siguranță prevăzute pentru manipularea medicamentelor de uz veterinar.

În timpul manipulării, este interzis fumatul, consumul de alimente și băuturi.

După terminarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Nu se recomandă mângâierea animalului și contactul acestuia cu copii mici până la uscarea completă a suprafeței tratate (24 de ore după aplicare).

Persoanelor cu hipersensibilitate le este recomandat să evite contactul direct cu medicamentul.

În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele oculare, acestea trebuie spălate imediat cu apă din abundență.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice, este necesar să se adreseze unui centru medical (având eticheta sau prospectul medicamentului).

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Este interzisă utilizarea medicamentului în timpul gestației și alăptării.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 3 luni.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pipete-picurători din polimer x 0,3; 0,6; 1,0; 1,4; 2,8 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru