

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ferran

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO"Biovet", 4550 Bulgaria, or.Peștera, str. Piotr Rakov 39 Reprezentanța
OOO"Huvepharma "(Bulgaria) în or. Moscova; 115191, or.Moscova, pr. 4 Roscinskii,
c. 19

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ferran – soluție injectabilă.

1 ml de preparat **conține:**

Fier trivalent (în complex cu dextran) – 100 mg

Ciancobalamină – 0,005 mg

Acid folic – 0,2 mg (sub formă de hidroclohid)

Substanța activă:

Fier trivalent, vitamina B9, vitamina B12

Excipienți:

Apă pentru injecții.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ferranul se administrează tineretului bovin și ovin, porceilor, mînjilor, animalelor de blană și câinilor cu scop preventiv și curativ în cazul anemiilor (posthemoragice, hemolitice, hipoplastice și aplastice, alimentare).

4. CONTRAINDICAȚII

Animalelor cu sensibilitate sporită față de complexul de ferodextran, anemiilor nebazate pe deficitul de fier (sideroblastică, intoxicații cu plumb), surplus de fier în organism, dereglarea metabolismului de fier, boli alergice ale pielii, glomerulonefrită acută, dereglări hepatice (hepatite) și renale (glomerulonefrită, pielonefrită), precum și în carența acută a vitaminei E, este contraindicată administrarea Ferranului.

5. REACȚII ADVERSE

În cazul supradozării, animalul poate refuza hrana sau poate apărea reacția în locul inoculării. În acest caz, se recurge la terapie specifică cu preparate chelatorii.

Nu au fost înregistrate reacții specifice la prima administrare a preparatului sau la neglijarea unui dozaj.

În cazul neglijării unui dozaj, este important să se reia administrarea în aceeași doză conform aceleiași scheme. Nu se admite injectarea preparatului în dozaj dublu pentru compensarea celui neglijat.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, câini, animale de blană.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Preparatul Ferran se administrează i/muscular în latura gâtului sau în regiunea membrului posterior. Pentru a evita scurgerea preparatului, pielea în momentul administrării se trage puțin la o parte. Dacă preparatul se administrează în perioada

rece a anului, este necesar ca flaconul cu soluție să fie încălzit la baia cu aburi, până la o temperatură de 36-39°C.

În scop preventiv, preparatul Ferran se administrează în următoarele doze (ml la cap):

- Scroafelor cu 15-20 zile înainte de fătare – 8-10 ml;
- Purceilor la a 3-5 zi de viață – 1-1,5 ml;
- Vițeilor și mânjilor la a 3-4 zi de viață – 4-6 ml;
- Mieilor la a 5-6 zi de viață – 1-1,5 ml;
- Câșteilor și puilor animalelor de blană – 1 ml.

În scop curativ, preparatul Ferran se administrează animalelor mai mari de 2-3 săptămâni, în următoarele doze (ml la cap):

- Purceilor – 2-3 ml;
- Vițeilor și mânjilor – 6-8 ml;
- Mieilor – 2-3 ml;
- Câșteilor și puilor de animale de blană – 2 ml.

În cazul stărilor grave, se administrează repetat peste 10-12 zile în același dozaj.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Preparatul Ferran nu se asociază cu antibiotice din grupa tetraciclinelor și penicilinelor deoarece în acest caz se formează compuși chelatori care încetinesc reabsorbția fierului și a antibioticelor. Administrarea concomitentă a glucocorticosteroizilor sporește eritropoeza.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 30 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Se produce preparatul ambalat în flacoane de câte 10, 20, 50, 100, 250 și 500 ml, în flacoane din polimer de volum corespunzător, închise cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru