

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Lacto-Stop

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO „Apicenna”, reg Moscova, or.Balașiha, ș.Poltevskoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Lacto-Stop – soluție pentru uz intern.

Lacto-Stop în 1 ml conține:

- **Substanță activă:** cabergolină – 50 mg
- **Adjuvanți:** trigliceride cu catenă medie (MCTs).

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Preparatul Lacto-Stop se utilizează pentru eliminarea simptomelor de gestație falsă, pentru profilaxia mastitei lactaționale, în cazul întârcării precoce a cățeilor și motănașilor, pentru suprimarea lactației fiziologice și tratamentul dereglărilor cauzate

de hiperprolactinemie, inclusiv la animale cu antecedente de adenom hipofizar (micro- și macroprolactinemie), precum și în caz de hiperprolactinemie idiopatică.

4. CONTRAINDICAȚII

Contraindicațiile pentru administrarea preparatului includ sensibilitatea individuală sporită a animalului față de cabergolină, hipotensiunea arterială, insuficiența renală și hepatică în antecedente.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea preparatului conform instrucțiunilor, reacții adverse și complicații nu apar. La unele animale, în primele două zile de administrare, poate apărea o scădere a apetitului, somnolență sau vomă, ceea ce nu necesită oprirea tratamentului. În caz de vomă, preparatul se administrează pe stomacul gol.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Preparatul se administrează câinilor și pisicilor pe cale orală, fie amestecat cu hrana, fie administrat direct, cu ajutorul dozatorului, aplicându-se pe rădăcina limbii, o dată pe zi, timp de 4-7 zile, în doză de 0,1 ml/kg greutate corporală.

Supradozare:

În caz de supradozare, pot apărea simptome precum vomă, somnolență, pierderea cunoștinței de scurtă durată și edemul mucoaselor nazale. La animale sensibile, sunt posibile reacții alergice sub formă de prurit, edem, dermatită sau urticarie. În aceste cazuri, administrarea preparatului se oprește și se recomandă terapie simptomatică și desensibilizantă.

Reacții la prima administrare:

La prima administrare, animalul poate prezenta hipersalivație sau vomă, care dispar spontan.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra preparatul în ambalajul original închis al producătorului, într-un loc ferit de razele solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

La administrarea preparatului conform instrucțiunilor date, reacții adverse și complicații nu apar. La unele animale, în primele două zile de administrare, poate apărea o scădere a apetitului, somnolență sau vomă, ceea ce nu necesită oprirea administrării. (În caz de vomă, preparatul se administrează pe stomacul gol.)

Nu se recomandă administrarea preparatului Lacto-Stop concomitent cu antagoniștii dopaminici ai receptorilor D2 (derivați ai fenotiazinei, butirofenonului, tioxantenei și metoclopramidului). Preparatul Lacto-Stop trebuie administrat cu atenție în asociere cu medicamente hipotensive.

Lacto-Stop nu se administrează animalelor productive.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 28 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Preparatul este ambalat în flacoane din polimer de culoare închisă, cu capacități de 5, 7, 10, 15 și 20 ml, prevăzute cu capace swift-off din plastic și sigiliu. Fiecare flacon este ambalat într-o cutie de carton, alături de un dozator și instrucțiuni de utilizare.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru