

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### Felocell 3

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgia

**Producător**

Zoetis Inc.  
Kalamazoo, MI 49001  
USA

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Felocell 3 – vaccin viu atenuat contra panleucopeniei, rinotraheitei virale și calicivirozei virale feline.

Felocell 3 este un vaccin constituit dintr-o fracțiune liofilizată ce conține virusurile atenuate FPV, FVR și FCV și care se reconstituie cu diluant steril.

Fiecare doză (1 ml) de Felocell 3 conține:

**Substanța activă:**

- Virus enteritei feline (panleucopenia) viu atenuat – FPV, tulpina Snow Leopard, minim  $10^{3.0}$  CCID<sub>50</sub>
- Virusul rinotraheitei feline viu atenuat – FVR, tulpina FVRm, minim  $10^{5.7}$  CCID<sub>50</sub>
- Virusul calicivirozei feline viu atenuat – FCV, tulpina F9, minim  $10^{6.2}$  CCID<sub>50</sub>

**Alți constituenți:**

- Diluant: apă pentru preparate injectabile.

### 3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Felocell 3 se indică pentru inducerea imunității active a pisicilor sănătoase împotriva virusului rinotraheitei, a calicivirusului și a virusului enteritei feline (panleucopeniei).

### 4. CONTRAINDICAȚII

Animalele în perioada de incubație a unei boli infecțioase, malnutriția și invaziile parazitare nu trebuie vaccinate.

### 5. REACȚII ADVERSE

Administrarea conform instrucțiunii date nu provoacă reacții adverse și complicații. În rare cazuri, se poate manifesta reacție anafilactică; în aceste cazuri, se recurge la terapie simptomatică.

### 6. SPECII ȚINTĂ

Pisici.

### 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Este recomandată vaccinarea pisicilor sănătoase. Se va reconstitui liofilizatului cu diluantul steril, se agită bine și se administrează 1 ml intramuscular sau subcutanat.

**Prima vaccinare:**

Pisicile sănătoase cu vârsta de 12 săptămâni trebuie să fie vaccinate de 2 ori la interval de 3-4 săptămâni. Pisicile vaccinate mai devreme de 12 săptămâni vor fi revaccinate când vor împlini această vârstă.

### **Revaccinarea:**

Se recomandă revaccinarea anuală cu o singură doză.

### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 2°C + 8°C, în locuri inaccesibile copiilor.

### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

- Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.
- Nu se vaccinează animalele pentru cel puțin o lună după încetarea tratamentului cu corticosteroizi.
- Pentru administrarea vaccinului se vor folosi ace și seringi sterile.
- Nu se va steriliza locul administrării cu substanțe chimice, deoarece urmele rămase pot inactiva vaccinul.
- În timpul lucrului cu Felocell 3, este important să respectați regulile comune de igienă personală și de tehnică de siguranță în lucrul cu preparate medicamentoase.
- A se evita contactul direct cu pielea sau mucoasele. În caz de contact accidental, acestea se spală din abundență cu apă.
- În timpul lucrului nu se va fuma, consuma băuturi sau alimente.
- La finisarea lucrului, mâinile se spală cu apă și săpun.
- Vaccinul nu trebuie folosit la pisicile gestante.

### **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

18 luni din data producerii, de la prima deschidere – a se folosi imediat.  
A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

#### **14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

- Vaccin: flacon din sticlă de 1 ml (1 doză vaccinală), cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.
- Diluant: flacon de sticlă de 1 ml.

#### **15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)