

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Vacderm F

Vaccin contra dermatofitozelor la pisici

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO firma "VETZVEROȚENTR", 129337, or. Moscova, pasaj Hibinskii 2

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Vacderm-F - suspensie injectabilă (vaccin inactivat) obținută din celule de dermatofiti din tulpinile *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum* și *Trichophyton mentagrophytes* crescuți pe medii nutritive selective și inactivați cu formalină.
1 doză comercială (1 cm³) conține 50-80 mln. de elemente fungice.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Vaccinul Vacderm-F se indică în profilaxia și tratamentul dermatofitozelor la pisici.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează pisicile bolnave de boli infecțioase sau parazitare, cele slăbite, cu temperatura corpului ridicată, femelele gestante în simestrul doi. Se interzice administrarea vaccinului Vacderm-F concomitent cu preparate imunosupresive.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii date, reacții adverse și complicații nu apar. În caz de imunizare în perioada de incubație a dermatofitozelor, provoacă apariția accelerată a semnelor clinice de micoză în locurile de localizare a fungilor (pe piele apar focare unice sau multiple).

În caz de supradozare, a administrării vaccinului rece sau folosirea instrumentarului nesteril, unele animale în locul inoculării pot manifesta reacție postvaccinală locală sub formă de tumefiere sau inflamație. Pisicile pot deveni somnolente, stare care dispare peste 2-3 zile. În caz de reacții postvaccinale, animalului i se oferă liniște, locul inoculării se prelucrează cu tinctură de iod (5%) și se tratează ca o inflamație.

6. SPECII ȚINTĂ

Pisici de la 1 lună.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Vaccinul Vacderm-F se administrează i/muscular, cu rapel. Injectarea se efectuează în mușchii membrului posterior, (preferabil ca vaccinarea să fie făcută pe o parte a corpului pentru ca revaccinarea să fie efectuată pe partea opusă) cu interval de 10-14 zile în următoarele doze:

- Pisici 1-3 luni - 0,5 cm³.
- Pisici mai mari de 3 luni-1,0 cm³.

Revaccinările de profilaxie se efectuează anual, cu rapel la 10-14 zile, în dozele indicate mai sus.

Cu 10 zile în prealabil, animalul se dehelmintizează. Pentru vaccinare se folosește instrumentar steril, ac individual la fiecare animal, locul injectării se dezinfectează cu alcool de 70%. Flaconul cu vaccină se încălzește până la temperatura corpului și se agită pentru a fi omogenizat.

În cazul inumizării animalelor în perioada de incubație a dermatofitozelor și apariția focarelor, se recurge la vaccinare cu rapel la 10-14 zile în aceeași doze, conform aceeași scheme.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 2°C + 10°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele D-ră.

Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.

Imunizarea animalelor în primul trimestru al gestației și în perioada lactației se face cu precauție sub supravegherea medicului veterinar.

Animalele slăbite sau bolnave (cu excepția dermatofitozelor) mai întâi se tratează și apoi se vaccinează.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

18 luni din data producerii, de la prima deschidere – 30minute.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane sau fiole din sticlă a câte 1-5 doze comerciale, flacoane din sticlă a câte 10 doze.

O doză comercială - 1 cm³.

Flacoane ermetic închise cu dop din cauciuc și capace din aluminiu.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru