

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Milprazon 12,5 mg / 125 mg

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Deținătorul autorizației de comercializare:

KRKA, ci.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto
Slovenia

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Milprazon 12,5 mg / 125 mg – comprimate pentru câini de talie mică și căței cu greutatea de cel puțin 5 kg indicate pentru tratamentul infestațiilor mixte determinate de cestode adulte și nematode.

Fiecare comprimat **conține:**

- **Substanțe active:** Milbemycin oxime 12,5 mg, Praziquantel 125,0 mg.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Câini: Tratamentul infestațiilor mixte cauzate de cestode adulte și nematode din speciile:

Cestode: *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*

Nematode: *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Crenosoma vulpis* (reducerea nivelului infestației), *Angiostrongylus vasorum* (reducerea nivelului infestației cu paraziți în stadiul de adult imatur (L5) și adult), *Thelazia callipaeda*.

Produsul poate fi utilizat și pentru prevenirea filariozei cardiace (*Dirofilaria immitis*), dacă este necesar un tratament concomitent împotriva cestodelor.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la câini cu greutatea corporală sub 5 kg.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

5. REACȚII ADVERSE

În cazuri foarte rare, după administrarea la câini a combinației Milbemycin oxime și Praziquantel, au fost observate semne sistemice (letargie), semne neurologice (tremor muscular și ataxie) și/sau semne gastrointestinale (vărsături, diaree, anorexie și hipersalivație).

6. SPECII ȚINTĂ

Câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Greutatea corporală	Număr de comprimate
5 – 25 kg	1
>25 – 50 kg	2
>50 – 75 kg	3

În cazurile în care se administrează un tratament profilactic împotriva filariozei cardiace și, în același timp, este necesară aplicarea unui tratament împotriva

cestodelor, produsul poate înlocui produsul monovalent pentru profilaxia filariozei cardiace.

Pentru tratamentul infestării cu *Angiostrongylus vasorum*, Milbemycin oxime poate fi administrat de patru ori, la intervale săptămânale. În cazurile în care este indicat și un tratament concomitent împotriva cestodelor, se recomandă administrarea produsului o singură dată, după care tratamentul va continua cu un produs monovalent care conține doar Milbemycin oxime, pentru restul de trei săptămâni.

În zone endemice, administrarea regulată a produsului la fiecare 4 săptămâni va preveni angiostrongiloza, prin reducerea numărului de adulți imaturi (L5) și infestările patente, atunci când este indicat un tratament concomitent împotriva cestodelor.

Pentru tratamentul infestării cu *Thelazia callipaeda*, Milbemycin oxime trebuie administrat în două serii de tratament, la interval de 7 zile. Dacă este necesar un tratament concomitent împotriva cestodelor, produsul poate înlocui produsul monovalent care conține doar Milbemycin oxime.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Rezistența paraziților la orice clasă specifică de antihelmintice poate apărea în urma utilizării frecvente și repetate a unui antihelmintic din acea clasă.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau ouat

Produsul poate fi utilizat la câini de reproducție, inclusiv femele gestante și în lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu au fost observate interacțiuni în cazul administrării unei doze recomandate de selamectină (lactonă macrocică) în cursul tratamentului cu asocierea Milbemycin oxime și praziquantel.

În absența unor studii suplimentare, se recomandă precauție la utilizarea concomitentă a produsului împreună cu alte lactone macrocice.

De asemenea, nu au fost efectuate astfel de studii la animale de reproducție.

Precauții speciale pentru persoana care administrează produsul

Spălați-vă pe mâini după utilizare.

În caz de ingestie accidentală a comprimatelor, în special la copii, solicitați imediat asistență medicală și prezentați prospectul produsului sau eticheta acestuia.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Blistere a câte 2 comprimate, 1 blister per pachet.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru