

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ascacid F

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

„SC VANELLI SRL”, str. Iași-Târgu Frumos, km 10, sat Lețcani, Comuna Lețcani, 707280
jud. Iași, România

Tel: +40 232 253 442

E-mail: office@vanellivet.com

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ascacid F – 7,5 mg – comprimat pentru suine și păsări (găini, curci, găște, fazani, potârnicși, prepelițe).

1 comprimat conține:

Substanța activă:

Flubendazol – 7,5 mg.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Indicații pentru utilizare la suine și păsări (găini, curci, găște, fazani, potârnicși, prepelițe) în tratamentul infestațiilor cu paraziți sensibili la acțiunea substanței active, cum ar fi:

- **Suine:** *Ascaris suum*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichocephalus suis*, *Metastrongylus spp.*, *Trichinella spiralis*.
- **Păsări:** *Ascaridia galli*, *Heterakis spp.*, *Capillaria spp.*, *Trichostrongylus tenuis*, *Syngamus trachea*.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

5. REACȚII ADVERSE

Produsul, administrat conform indicațiilor, este bine tolerat. Dacă observați efecte severe sau alte efecte nementionate în acest prospect, anunțați de urgență medicul veterinar. Nu s-au evidențiat efecte asupra fertilității sau efecte teratogene la suine.

6. SPECII ȚINTĂ

Suine și păsări (găini, curci, găște, fazani, potârnicși, prepelițe).

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se administrează oral:

- La suine: 1 comprimat/kg greutate corporală, în furaj, un singur tratament pe lună. Pentru infestațiile cu *Trichinella spiralis*, tratamentul se începe cu trei luni înainte de sacrificare, administrându-se câte 2 comprimate/kg greutate corporală, timp de trei zile, în fiecare lună.
- La păsări (găini, curci, găște, fazani, potârnicși, prepelițe) se administrează individual, 1 comprimat pentru puiul cu greutatea de 150 grame și 2 comprimate pentru puiul cu greutatea de 500 grame. Pentru păsările adulte se va administra 1 comprimat/kg greutate corporală, timp de 2 zile consecutiv.

Pentru a asigura o administrare corectă a dozei terapeutice, trebuie să se determine greutatea corporală a animalului cât mai precis.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe - 28 zile

Ouă (găini) - 0 zile

Ouă ce provin de la celelalte specii de păsări - 7 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Următoarele practici cresc riscul dezvoltării rezistenței și, în consecință, pot determina ineficiența terapiei antihelmintice:

- Utilizarea repetată și prea frecventă a antihelminticelor din aceeași clasă, pe o perioadă mai lungă de timp.
- Subdozarea, care poate fi determinată de o subestimare a greutateii corporale a animalului sau de o administrare incorectă a produsului.
- Cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie investigate utilizând teste paraclinice (ex: testul de numărare a ouălor din fecale). În situația în care testele indică rezistența față de o anumită clasă de antihelmintice, trebuie utilizat un antihelmintic care aparține unei clase farmacologice diferite și care are un mecanism diferit de acțiune.

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

Precauții speciale pentru utilizarea la animale:

Administrarea produsului are rezultate optime dacă se respectă strict condițiile de igienă din adăposturile animalelor tratate.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele care sunt sensibile la flubendazol trebuie să evite contactul direct cu produsul.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din polietilenă de înaltă densitate cu 100 comprimate și flacon cu 1000 comprimate.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru