

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

CIFLUNIT-ON

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "NITA-FARM", 410010, g. Saratov, ul. Osipova V.I. 1

Tel/fax: +7 (8452) 338-600

E-mail: client@nita-farm.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ciflunit-ON (Cyflunit-ON) - denumirea internațională nepatentată: cifluthrin.

Preparatul Ciflunit-ON conține, în calitate de substanță activă: cifluthrin 5%, stabilizator și diluanți până la 100%. Soluție concentrată de culoare de la pal-galben până la galben-marou.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ciflunit-ON se indică pentru prevenirea și combaterea gândacilor de bucătărie, furnicilor, ploșnițelor, puricilor, muștelor, țânțarilor, dăunătorilor de depozit,

acarienilor roșii ai găinilor și altor insecte în prelucrarea încăperilor, adăposturilor și a teritoriului adiacent de menire veterinară, în lipsa animalelor.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu este cazul.

5. REACȚII ADVERSE

În caz de contact accidental și nerespectarea măsurilor de precauție se poate întâmpla intoxicare. La manifestarea primelor simptome, victimei i se acordă primul ajutor: se scoate din încăperea, se îndepărtează haina murdară, se clătește gura cu soluție de bicarbonat de sodiu (1/2 linguriță/1 pahar de apă) sau cu apă fiartă.

În caz de contact cu pielea, atent, fără a se freca, se înlătură cu un tampon sau cârpă, se spală cu apă și săpun și se aplică o cremă emolientă.

În urma contactului cu mucoasa oculară, se spală imediat cu un jet de apă și se picură sulfacil de sodiu (albicid).

În caz de ingerare accidentală, este necesar să se bea apă cu permanganat de potasiu (KMnO₄) de culoare pal-roză, apoi un absorbant (10-15 pastile de cărbune activat/1 pahar de apă). Nu se provoacă vomă. Se recomandă a se adresa unei instituții medicale (cu eticheta sau instrucțiunea preparatului).

Persoanelor cu sensibilitate sporită li se recomandă evitarea contactului direct cu preparatul Ciflunit-ON. În caz de apariție a reacției alergice, se recomandă a se adresa unei instituții medicale (cu eticheta sau instrucțiunea preparatului).

6. SPECII ȚINTĂ

*Pentru încăperi.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru prelucrare se folosește soluție de Ciflunit-ON proaspăt pregătită, în diluțiile indicate în tabel.

Pentru pregătirea soluției, se ia conform tabelului cantitatea necesară de Ciflunit-ON și se adaugă în volumul necesar de apă, omogenizându-se la temperatura camerei.

Specia insectelor	Diluția	Cantitatea de preparat la 1L de apă	Volumul de preparat pentru prelucrarea m ²	
Acarienii roșii a găinilor	1:100	10 ml	Suprafața non-absorbantă	Suprafața absorbantă

Dăunătorilor de depozit	1:100	10 ml	50/ml ²	100ml/m ²
Gândac de bucătărie	1:100	10 ml		
Furnici, muște imago/larve	1:200	5 ml		
Ploșnițe, purici, țânțari imago/larve, acareni roșii ș.a.	1:400	2,5 ml		

Pentru prelucrare se folosesc diferite dispozitive pentru pulverizare și aspersare. Consumul de soluție diferă în funcție de tipul suprafeței prelucrate: de la 50 ml/m² (suprafețe non-absorbante) și 100 ml/m² (suprafețe absorbante). Se înlătură soluția aplicată de pe suprafețele prelucrate cu cârpă umedă, peste 24 de ore după aplicare, dar nu mai târziu de 3 ore înainte de începerea noului program de lucru; din alte locuri - peste 1-3 luni. Prelucrările repetate se efectuează la indicația entomologică (la apariția insectelor).

Prelucrarea prin pulverizare se efectuează în lipsa păsărilor, cu ventilarea oprită, sub formă de ceață, cu ajutorul generatorului de ceață sau alt dispozitiv. Soluția folosită este de 10% (1 parte de Ciflunit-ON la 9 părți de apă), cu un consum de 10 litri la 1000 m³.

La finalizarea prelucrării, hrănitorile, adăpătorile și utilajul se spală cu apă caldă, iar încăperea se aerisește și se usucă.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.

Înainte de prelucrarea prin aspersare sau pulverizare, încăperea se curăță mecanic și se spală. Pe durata prelucrării, din încăperea se scot recipientele alimentare, furajele și produsele ce pot absorbi soluția. În timpul prelucrării, în încăperi se interzice prezența animalelor sau persoanelor străine.

Toate lucrările (dezinsecția și curățenia după) se efectuează cu feronetele deschise. La finalizarea prelucrării, hrănitorele, adăpătorile și utilajul se spală cu apă caldă, încăperea se aerisește cel puțin 2 ore și se usucă.

Se înlătură soluția după prelucrare prin metoda umedă, în primul rând de pe podea și suprafețele de pe care reziduurile pot nimeri în alimente (mese, dulapuri, rafturi, utilaj etc.); pe restul suprafețelor (ce nu contactează direct cu oamenii sau animalele) se lasă până la reducerea eficienței - 1-3 luni.

Ciflunit-ON poate interacționa cu alte remedii insectoacaricide, de aceea nu se folosește în asociere, deoarece poate duce la scăderea eficienței.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – 28 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din polimer de 100 și 500 ml, butelie din polimer de 1000 ml, canistră din polimer de 3000 și 5000 ml cu capac securizat din polimer.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru