

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Cloziverm

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OAo „BelVitunifarm”, 211309, sat Dolja, str. Sovetskaia d. 26A, raionul Vitebsk, regiunea Vitebsk, Republica Belarus.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Cloziverm - 1 ml de soluție injectabilă conține, în mg:

- **Substanță activă:**
 - Ivermectin: 10 mg
 - Clozantel de sodiu: 125 mg
- **Excipienți:**
 - 1-metil-2-pirolidonă

- Alcool benzilic
- Propilenglicol
- Apă pentru injecții.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Medicamentul de uz veterinar Cloziverm, se indică în tratamentul bovinelor și ovinelor în caz de dictiocauloză, hemonhoză, ostertagioză, tricostrongiloză, cooperioză, nematodiroză, bunostomiază, strongiloidiază, fascioloză, telazioză, hipodermatoză, estroză, sarcoptoidoză.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se folosi animalelor bolnave, femelelor gestante și celor în lactație, al căror lapte se dă în consum uman. De asemenea, nu se administrează simultan cu antiparazitare clororganice și fosfororganice.

5. REACȚII ADVERSE

Nici o reacție adversă nu a fost observată în cursul testelor experimentale sau al studiilor clinice.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Cloziverm se administrează subcutanat sau intramuscular în regiunea subscapulară o dată, în doză de 1 ml/50 kg masă corporală. În cazul scabiei la animale, se va administra repetat, la interval de 7-14 zile.

În cazul tratamentelor în masă, fiecare lot este testat preliminar pe un grup mic (5-10 animale). În absența complicațiilor după 3 zile, medicamentul poate fi utilizat și pentru celelalte animale din șeptel.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe - 35 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi între +4°C și +25°C.

După deschiderea flaconului, Cloziverm poate fi folosit timp de 21 de zile, fiind păstrat la temperaturi între 2°C și 8°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Se va administra numai speciilor indicate în prospect, conform instrucțiunilor de la secțiunea dozare și administrare.

Nu se folosește concomitent cu antiparazitarele clororganice sau fosfororganice.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 21 de zile, fiind păstrat la temperaturi între 2°C și 8°C.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Este ambalat în flacoane sterile de sticlă, cu o capacitate de 50, 100 și 200 ml.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru