

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **Coliflox**

buvabil

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**  
OOO NVТ „Agrovezașcita S-P”, 141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Coliflox buvabil – soluție buvabilă care în 1 ml conține în calitate de substanțe active: enrofloxacină – 100 mg, colistin sulfat – 1000000 UI și excipienți.

**3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Coliflox buvabil se indică în tratamentul și profilaxia colibacteriozei, salmonelozei, bolilor respiratorii cronice, streptococozei, enteritei necrotice, hemofilozei, micoplasmozei, în cazul bolilor mixte și al celor secundare bolilor virale la păsări, și porceilor - în cazul colibacteriozei și enteritelor bacteriene, agenții cărora sunt sensibili la enrofloxacină și colistin.

#### **4. CONTRAINDICAȚII**

Sensibilitate individuală sporită la componentele preparatului. A nu se administra găinilor ouătoare și tineretului de înlocuire cu 2 săptămâni înainte de începutul ponteii din cauza acumulării enrofloxacinei în ouă, femelelor gestante și în lactație, purceilor sub 20 kg, animalelor cu patologii ale țesutului cartilajinos, cu patologii renale, hepatice și ale SNC însoțite de convulsii.

Este contraindicată administrarea concomitentă cu levomicetina, macrolidele, tetraciclinele, teofilina, ionoforii polieterici, antiinflamatoarele nesteroidiene, preparatele de magneziu și calciu.

#### **5. REACȚII ADVERSE**

În doze terapeutice (conform instrucțiunii date) nu provoacă reacții adverse. În caz de sensibilitate individuală sporită și apariția reacției alergice, administrarea se oprește și se indică terapie simptomatică.

#### **6. SPECII ȚINTĂ**

Porci, păsări domestice.

#### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Coliflox buvabil se administrează per os, cu apă de băut, în grup, puilor broiler, păsărilor de prăsilă, tineretului de înlocuire și curcilor, în doză de 0,5 ml/1 l apă, timp de 3-5 zile; în caz de salmoneloză, infecții mixte și în cazul bolilor cronice, 1,0 ml/1 l apă timp de 5 zile.

Pe durata tratamentului, e important ca pasărea să primească doar apă cu medicament. Soluția curativă se prepară zilnic, în volum necesar pentru tot parcursul zilei. Purceilor, Coliflox buvabil se administrează în doză de 0,3 ml/kg masă corporală, cu apă (în raport de 1:1), o dată pe zi, timp de 2-3 zile. În cazuri grave, doza poate fi majorată la 0,5 ml/kg masă corporală.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Păsări - 11 zile, porcine - 14 zile. Carcasele obținute înainte de expirarea termenului limită se dau în hrana animalelor de blană.

#### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

**10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

**11.ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Nu sunt.

**12.PERIOADA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

**13.STATUT LEGAL**

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

**14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacon din sticlă întunecată de câte 10, 20, 50 și 100 ml, cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

**15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)