

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **Draker DK**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL, Via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD)

Italy

Tel. +39 049 9337111

[www.vebi.it](http://www.vebi.it)

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Draker DK – Insecticid concentrat lichid microcapsulat pentru uz profesional și casnic.

100 ml de produs conțin:

Cipermetrină (CAS 52315-07-8; CE 257-842-9) 10.0 g (10%)

Tetrametrină (CAS 7696-12-0; CE 231-711-6) 2.0 g (2%)

Piperonil butoxid (CAS 51-03-6; CE 200-076-7) 10.0 g (10%)

Coformulanți până la 100 g

### 3. INDICAȚII TERAPEUTICE

DRAKER 10.2 / DK 10.2 elimină insectele prezente la momentul tratamentului și previne infestarea ulterioară timp de 2 săptămâni. Este un insecticid utilizat împotriva majorității insectelor dăunătoare în sectorul civil, casnic și industrial (gândaci de bucătărie, scorpioni, furnici, purici, căpușe, păianjeni, gândacul “peștișor argintiu”, insecte care infestază magazinele, invadatori ocazionali, precum și acarieni). Este eficient și împotriva insectelor zburătoare (țânțari, musca de casă).

### 4. CONTRAINDICAȚII

A nu se pulveriza produsul în aer; pulverizați exclusiv pe suprafețe.

A nu se contamina alimente, băuturi și recipientele destinate păstrării lor în timpul utilizării.

A se evita inhalarea substanței pulverizate în timpul utilizării.

A se spăla mâinile cu apă și săpun în cazul contactului cu soluția insecticidă.

Nu utilizați produsul în forma concentrată; respectați instrucțiunile producătorului.

### 5. REACȚII ADVERSE

Dacă sunt respectate instrucțiunile de utilizare reacții adverse nu apar.

### 6. SPECII ȚINTĂ

Interior (încăperi, suprafețe ș.a.), exterior.

### 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

A nu se pulveriza produsul în aer; pulverizați exclusiv pe suprafețe. A nu se contamina alimentele, băuturile și recipientele destinate păstrării lor în timpul utilizării. A se evita inhalarea substanței pulverizate în timpul utilizării. A se spăla mâinile cu apă și săpun în cazul contactului cu soluția insecticidă. Nu utilizați produsul în forma concentrată; respectați instrucțiunile producătorului.

**În interior:** distribuiți uniform prin pulverizare pe suprafețele unde sunt insecte sau pe traseele pe care acestea circulă, în special în unghere, la plinte, în fisuri și crăpături, deasupra și sub mobilier, sub aparate electrocasnice și chiuvete.

**În exterior:** aplicați prin pulverizare pe pereți, feronerie, pervazuri, streșini, garduri vii și în spațiile de depozitare a deșeurilor.

### **Dozaj:**

- **Suprafețe neabsorbante:** 5-10 ml produs la 1 litru de apă, în funcție de gradul de infestare.
- **Suprafețe absorbante (pereți poroși/nefinisați):** 10-20 ml la 1 litru de apă.
- **Țânțari și furnici:** 5-20 ml la 1 litru de apă.
- **Muște și gândaci:** 10-30 ml la 1 litru de apă.
- **Căpușe:** 8-15 ml la 1 litru de apă.

**Timp de acțiune:** mortalitate de 100% până la 24 de ore, repetare peste 7 și 14 zile. 1 litru de soluție este eficient pentru tratarea unei suprafețe de 25 m<sup>2</sup>.

Pentru căpușe, 1 litru de soluție este eficient pentru tratarea unei suprafețe de 40 m<sup>2</sup>, cu o repetare peste 5 săptămâni la suprafață non-poroasă și 2 săptămâni la suprafață poroasă.

### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Produsul conține cipermetrină și poate provoca parestezie.

### **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

- Fiolă de 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, ambalate în cutie de carton care conține 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 și 100 de fiole.
- Flacoane de 50, 60, 75, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 ml; 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25 litri.
- Flacon dozator potrivit de 50, 60, 75, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 ml.
- Rezervor de 2, 5, 10, 20 și 25 l.

### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)