

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Eimeterm 2,5%

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO "NVȚ Agrovetzașcita S-P "141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Eimeterm 2,5% - (*Solutio Eimeterum 2,5%*).

Denumirea internațională nepatentată: toltrazuril.

Soluție per orală. Soluția Eimeterm 2,5 % în 1 ml conține toltrazuril – 25 mg și adjuvanți: trietanolamin și polietilenglicol. Se prezintă preparatul ca o soluție transparentă, de culoare de la galben la maro (se admite opalescență).

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Eimeterm soluție 2,5% se indică puilor broiler, tineretului de înlocuire, curcilor, găștelor și rațelor cu scop curativ-preventiv în caz de coccidioză, la apariția primelor simptome ale bolii.

4. CONTRAINDICAȚII

Contraindicații spre administrare poate servi sensibilitatea individuală sporită la componentele preparatului.

Se interzice administrarea Eimeterm soluție 2,5% găinilor-ouătoare și tineretului de înlocuire nu mai târziu decât cu 2 săptămâni înainte de pontă, deoarece se acumulează în ouă.

5. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse și complicații la păsări în urma administrării Eimeterm soluție 2,5% în conformitate cu instrucțiunea dată nu au fost înregistrate.

6. SPECII ȚINTĂ

Pui – broiler, tineretu de înlocuire, curci, găște, rațe.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Eimeterm soluție 2,5% se administrează păsărilor în apa de băut 2 zile consecutiv, în doză de 7mg toltrazuril /1 kg masă corp (28 ml de preparat /100 kg masă corp), ceea ce este echivalent cu:

1 ml/1 l apă de băut, care se dă în consum timp de 48 ore sau
3 ml/1 l apă de băut, care se dă în consum câte 8 ore timp de 2 zile.

În cazuri grave de boală, tratamentul se repetă peste 5 zile.

În timpul administrării Eimetermului soluție 2,5%, păsările e necesar să primească numai apă cu preparatul dat.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea puilor-broiler la carne se permite, nu mai devreme, decât peste 14 zile, a curcilor, găștelor și rațelor – nu mai devreme decât peste 16 zile de la ultima administrare a preparatului Eimeterm soluție 2,5%. În caz de sacrificare înainte de expirarea termenului limită – carnea poate fi folosită în hrana animalelor de blană.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C +5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Se interzice administrarea Eimeterm soluție 2,5% găinilor-ouătoare și tineretului de înlocuire nu mai târziu decât cu 2 săptămâni înainte de pontă, deoarece se acumulează în ouă.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere - 28 de zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Preparatul medicamentos este ambalat în flacoane de 5, 10, 20, 50 și 100 ml din sticlă sau polimer, cu volum corespunzător, prevăzute cu capace-picurători și/sau capace swist-off cu sigil sau dopuri din cauciuc și căpăcele din aluminiu; în flacoane de 500 ml din sticlă sau polimer, în sticle de 1 l din polimer; în canistre de 2,5; 3 și 5 l din polimer cu capac și sigil.

Flacoanele de 5, 10, 20, 50 și 100 ml sunt însoțite și de ambalaj secundar-cutii din carton.

Se permite producerea flacoanelor de 50 și 100 ml fără ambalaj secundar. Fiecare ambalaj conține instrucțiuni pentru administrare.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru