

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Fergolin

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "NITA-FARM", 410010, or. Saratov, str. Osipov V.I. 1

Tel/fax: +7 (4852) 338-600

e-mail: client@nita-farm.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Fergolin – soluție injectabilă.

Compoziție per 1 ml:

- **Substanță activă:** 0,1 mg gonadorelin acetat
- **Excipienți:** hidrofosfat de potasiu, dihidrofosfat de potasiu, clorură de sodiu, alcool benzilic, apă pentru injecții.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Stimulează și sincronizează ciclul estral, induce ovulația, tratează hipofuncția ovariană și chisturile foliculare, normalizează ciclul estral la vaci.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animale cu sensibilitate crescută la componentele medicamentului sau în cazul gestației avansate.

5. REACȚII ADVERSE

Administrarea conform prospectului nu provoacă reacții adverse sau complicații.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Fergolin se administrează intramuscular, cu dozaj variabil în funcție de indicații.

Indicații	Dozaj
Tratamentul chiștilor foliculari și hipofuncției ovariene.	5 ml, doză unică
Inducerea ovulației înainte de inseminare	2,5 ml, doză unică
Stimularea căldurilor și sincronizarea ciclului estral	1-2,5 ml, doză unică
Normalizarea ciclului estral (post-partum)	1-2,5 ml, doză unică

Se recomandă respectarea termenelor și dozelor de administrare pentru a nu diminua eficiența preparatului. În caz de omitere a unei administrări, schema se corectează în funcție de statutul fiziologic al animalului. Nu utilizați Fergolin dacă observați semne vizibile de deteriorare.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare sigură la speciile țintă:

Se utilizează echipament steril pentru administrare și se administrează profund intramuscular.

Precauții pentru persoana care administrează:

Respectați igiena personală și tehnicile de siguranță. Persoanele cu hipersensibilitate ar trebui să evite contactul direct. Fumatul, consumul de alimente și băuturi sunt interzise în timpul administrării. În caz de contact accidental cu pielea sau ochii, clătiți cu apă din abundență. Dacă se îngerează sau apar reacții alergice, consultați un medic, având instrucțiunile sau eticheta medicamentului la îndemână.

Protecția mediului:

Nu aruncați medicamentele în ape reziduale sau resturi menajere pentru a proteja mediul.

Gestație și lactație:

Poate fi utilizat la femelele gestante în primele două săptămâni de gestație și la cele aflate în lactație.

Interacțiuni:

Administrarea Fergolin nu exclude alte medicamente, dar acestea nu trebuie amestecate în aceeași seringă.

Supradozare:

Nu au fost observate simptome specifice în caz de supradozare.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 28 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane de sticlă de 20, 50 și 100 ml, etanș sigilate cu dopuri de cauciuc, consolidate cu capace din aluminiu cu clipuri de control al primei deschideri. Sticlele cu produsul pot fi ambalate în pachete individuale din carton. Fiecare ambalaj de consum este însoțit de un ghid de utilizare.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru