

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **Gamavit**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**  
ZAO „MICRO-PLUS”, 123098, Or. Moscova, str. Gamalei, nr. 18

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Gamavit – denumirea internațională nepatentată: nucleinat de sodiu și hidrolizat acid de placentă denaturată, emulsionată (PDE).

Soluție cu 0,02 mg de nucleinat de sodiu în 1 ml și 0,50 mg de PDE.

**3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Se indică pentru sporirea rezistenței organismului, în calitate de imunocorector și pentru diminuarea consecințelor intoxicațiilor la animale și păsări.

**4. CONTRAINDICAȚII**

Sensibilitatea sporită la componentele preparatului.

## 5. REACȚII ADVERSE

Administrarea conform instrucțiunii date nu provoacă reacții adverse și complicații. În caz de apariție a reacției alergice, se indică antihistaminice sau alt tratament simptomatic.

## 6. SPECII ȚINTĂ

Toate speciile de animale și păsări.

## 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Preparatul Gamavit poate fi administrat subcutanat, intramuscular, intravenos și cu apa de băut.

### **Cu scop preventiv:**

- Intramuscular, în caz de anemie, intoxicație, acidoză, în perioada postvaccinală, animalelor senile și slăbite, în perioada de convalescență și postoperatorie, în doză de 0,1 ml/kg masă corporală, 1-3 ori pe săptămână, timp de 2-4 săptămâni.
- Pentru majorarea sporului zilnic al tineretului la îngrășat, se administrează subcutanat, o dată pe zi, în doză de 0,1 ml/kg masă corporală, în zilele 1, 4 și 9 ale perioadei.
- Pentru sporirea vitalității vițelilor și purceilor nou-născuți, preparatul se administrează o dată pe zi, în doză de 0,1 ml/kg masă corporală, în zilele 1, 3, 5, 7 și 21.
- În caz de efort fizic sporit, pentru majorarea rezistenței la factorii de stres (pregătirea animalelor pentru expoziții, competiții, transport, regrupări) și în timpul vaccinărilor, se administrează o dată, înainte de acțiunea de stres, sau o cură în zilele 8, 6 și 4 înainte de expunere la stres.
- Găinilor ouătoare, pentru sporirea ponteii, a masei oului, vitalității puilor și sporului zilnic la puii de carne, Gamavit se administrează cu apa de băut. Se dizolvă 5 ml de preparat în 1 l de apă, administrată pe parcursul a 2 ore pe zi, timp de 4-5 zile. În prealabil, adăpatul se sistează cu 1 oră înainte.

### **Cu scop curativ:**

- În cazul bolilor infecțioase și parazitare (inclusiv piroplasmoză), se administrează intramuscular, de 2-3 ori pe zi, timp de 3-5 zile, în doză de 0,5 ml/kg masă corporală, în asociere cu terapia complexă.

- În dehelmintizări, se folosește împreună cu antihelminticele, conform instrucțiunilor, administrat intramuscular o dată, în doză de 0,3 ml/kg masă corporală în ziua dehelmintizării, cu rapel în aceeași doză peste 1 zi.
- Pentru sporirea fertilității femelelor animalelor domestice, se administrează subcutanat, în doză de 0,04 ml/kg masă corporală, cu câteva ore înainte de fecundare.
- Pentru fătări ușoare și profilaxia complicațiilor postpartum (endometrite și retenții placentare), se administrează subcutanat, în doză de 0,05 ml/kg masă corporală, cu o săptămână înainte de fătare și în perioada de pregătire pentru fătare.
- În caz de intoxicații, preparatul se administrează intravenos sau subcutanat, de 2 ori pe zi, câte 0,5-1,5 ml/kg masă corporală. Cea mai eficientă metodă de administrare este intravenoasă.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

#### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

#### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.

Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.

Particularități deosebite la prima administrare sau la anularea preparatului Gamavit nu au fost înregistrate. La omiterea unei administrări, tratamentul se reia conform aceleiași scheme, în același dozaj.

#### **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacon din sticlă de câte 6, 10 și 100 ml, cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)