

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Hidrodox 500 mg/g

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
Biovet JSC, 4550 or. Peshtera, str. Petar Rakov 39, Bulgaria.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Hidrodox 500 mg/g – se prezintă medicamentul ca o pulbere de culoare galbenă, fără miros specific.

1 g conține în calitate de substanță activă: 500 mg de doxiciclină sub formă de hieclat și adjuvanți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pui de găină (pui creșcuți pentru carne): prevenirea și tratamentul Bolii Respiratorii Cronice (BRC) produse de *Mycoplasma gallisepticum*.

Porci pentru îngrășare: prevenirea și tratamentul infecției respiratorii clinice produse de tulpini sensibile de *Pasteurella multocida*.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la tetraciline. A nu se administra animalelor cu insuficiență renală sau hepatică, femelelor gestante și în lactație, păsărilor ouătoare care produc ouă pentru consum uman, în asociere cu bactericide (peniciline, aminoglicozide etc.), cu antacide sau cu preparate care conțin caolin și fier.

5. REACȚII ADVERSE

Reacții alergice, de fotosensibilitate. Administrarea de lungă durată afectează microflora intestinală și pot apărea tulburări digestive. La apariția simptomelor menționate, administrarea se stopează.

6. SPECII ȚINTĂ

Porcine, pui de găină (pentru carne).

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se administrează în apa de băut.

Pui de găină (crescuți pentru carne): 20 mg doxiciclină (echivalentul a 40 mg de Hidrodox 500 mg/g) la 1 kg greutate corporală/zi, timp de 3-5 zile.

mg produs veterinar/L apă =

$(40 \text{ mg produs veterinar/kg greutate corporală/zi} \cdot \text{greutate corporală a păsărilor ce urmează să fie tratate (kg)}) / \text{cantitatea de apă consumată per kg greutate corporală (1)}$.

Porci la îngrășare: 10 mg doxiciclină (echivalentul a 20 g produs veterinar) /kg greutate corporală/zi, timp de 5 zile.

mg produs veterinar/L apă =

$(20 \text{ mg produs veterinar/kg greutate corporală/zi} \cdot \text{greutatea corporală medie a animalelor ce urmează să fie tratate (kg)}) / \text{cantitatea de apă consumată per kg greutate corporală}$.

La prepararea apei medicamentate, trebuie să se țină cont de greutatea corporală a animalelor care urmează să fie tratate și de cantitatea de apă pe care acestea o consumă zilnic. Consumul de apă poate varia în funcție de factori precum vârsta, starea sănătății, rasa și sistemul de creștere a animalelor. Pe baza dozei recomandate, a numărului de animale și a greutății lor corporale, doza exactă de Hidrodox 500 mg/g se calculează conform următoarei formule:

mg Hidrodox / kg greutatea corporală/zi	x	kg greutatea corporală/zi a animalelor ce urmează să fie tratate	= mg Hidrodox / l apă de băut
Cantitatea medie de apă potabilă			

Pentru stabilirea dozei corecte și evitarea subdozării, greutatea corporală trebuie determinată cât mai corect posibil.

Cantitatea de apă medicamentată consumată depinde de condiția clinică a animalelor. Se poate să fie nevoie de ajustarea concentrației pentru obținerea unui dozaj corect în apa de băut.

Pe tot parcursul tratamentului, animalele trebuie să beneficieze de acces suficient la sursa de apă, pentru a se asigura un consum necesar. Altă sursă disponibilă nu trebuie să fie la dispoziția animalelor tratate. Cantitatea de apă medicamentată trebuie consumată zilnic; ea se prepară la fiecare 24 de ore. Se recomandă prepararea unei soluții concentrate de 100 g/l de apă, apoi diluarea acesteia la concentrația terapeutică. Ca alternativă, soluția concentrată poate fi utilizată în dozatorul gradat de apă.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne porcine: 6 zile;

Pui de găină: 6 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Înainte de începerea tratamentului, trebuie stabilită prezența bolii clinice în efectiv. Datorită posibilei variabilități (timp, geografie) în ceea ce privește sensibilitatea bacteriilor la doxiciclină, se recomandă prelevarea și efectuarea testelor de sensibilitate. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informații epidemiologice locale, ținându-se cont și de politica oficială națională privind utilizarea antimicrobienelelor.

Subdozarea și tratamentul pentru o perioadă insuficientă se consideră că favorizează dezvoltarea rezistenței bacteriilor și trebuie evitate. A nu se folosi în timpul tratamentului articole oxidate. Pentru a evita precipitarea, nu se folosește apă cu pH mai mare sau egal cu 7,5.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – 24 ore.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pungi termosudate a câte 1 kg din poliester sau polietilenă tereftalată.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru