

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Neumosuin

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) SPANIA

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Neumosuin - Vaccin inactivat impotriva pleuropneumoniei porcine

Fiecare doză de 2 ml conține: Substanța activă:

Actinobacillus pleuropneumoniae inactivat, serotip 2..... MAT \geq 1/16

Actinobacillus pleuropneumoniae inactivat, serotip 4 MAT \geq 1/16

Actinobacillus pleuropneumoniae inactivat, serotip 5 MAT \geq 1/16

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pentru prevenirea pleuropneumoniei și pneumoniei produse de *Actinobacillus Pleuropneumoniae* la porcine

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active, la adjuvanți sau la oricare dintre excipienți. Nu se vaccinează porcii bolnavi.

5. REACȚII ADVERSE

Sporadic, la unele animale poate apărea o reacție anafilactică. În acest caz se va administra un tratament adecvat.

6. SPECII ȚINTĂ

Porcine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Utilizare intramusculară.

Porcine: 2 ml/animal, indiferent de greutate, vârstă sau sex.

În general se recomandă următorul program de vaccinare:

Scroafe: se vaccinează cu 40-45 de zile înainte de fătare, și se revaccinează 21 de zile mai târziu (cu 20-25 de zile înainte de fătare). Revaccinarea se face cu aproximativ o lună înainte de următoarea fătare.

Vieri: se vaccinează toate animalele, și se revaccinează 21 de zile mai târziu. După aceea se administrează câte o doză la fiecare 6 luni.

Purcei întarcati: se vaccinează la vârsta de 40-45 de zile și se revaccinează la vârsta 60-65 de zile.

Porci: se vaccinează toate animalele când ajung la fermă. Se revaccinează 3 săptămâni mai târziu.

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C) A nu se congela.

A se proteja de lumină.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă după EXP.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu există.

Incompatibilitati: A nu se amesteca cu nici alt produs medicinal veterinar.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: a se folosi imediat după desigilare.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Cutie de carton cu 1 flacoane din sticlă cu 50 doze. (100ml)

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru