

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Nobilis IB+ND+EDS

vaccin mixt inactivat contra bronșitei, pseudopestei și sindromului scăderii ouatului

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

MSD Animal Health, Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer
Olanda

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Nobilis IB + ND + EDS - se prezintă sub forma unui flacon ce conține un lichid uleos, omogen, de culoare albă, cu seringibilitate bună.

Compoziție:

Conține tulpine imunogene ale virusurilor: bronșitic (serotipul Massachusetts B.I. cu $> 6,0 \log^2$ unități); Newcastle (tulpina lentogenă Clona 30 cu >50 unități PD_{50}); sindromul căderii ouatului (EDS '76 cu $>6.5 \log^2$ unități IH). Virusurile sunt inactivate cu formol și emulsionate cu un adjuvant uleos.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Vaccinul se recomandă pentru pentru imunizarea reproducătorilor și ouătoarelor contra bronșitei infecțioasei, pseudopestei și sindromului căderii ouatului.

Vaccinul se recomandă pentru imunizarea reproducătorii și ouătoarele față de: serotipul Massachusetts al virusul B.I., virusul Newcastle și virusul EDS. Imunitatea pentru cele 3 virisuri durează toată perioada de ouat.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează păsările bolnave. Vaccinul nu se administrează 2 săptămâni după vaccinarea cu alte vaccinuri vii și cu 2-4 săptămâni înainte de începerea ouatului.

5. REACȚII ADVERSE

La locul de inoculare poate să apară un mic nodul care se resoarbe în timp.

6. SPECII ȚINTĂ

Puii de găină.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Fiecare pasăre se vaccinează intramuscular (în piept sau picior) sau subcutant (pe fața dorsală a gâtului) cu 0,5 ml vaccin. Flacoanele de 500 ml sunt pentru 1000 de păsări.

Nobilis IB+ND+EDS se administrează în jurul vârstei de 16-20 săptămâni (la transfer). Înainte de vaccinarea cu Nobilis IB+ND+EDS, tineretul va fi vaccinat cu vaccinurivii: antibronșitic și antipseudopestos. (pentru EDS'76 nu este necesară o prima vaccinare cu virus viu). Efectul imun cel mai bun se obține când intervalul dintre vaccinarea cu virus viu și cea cu virus inactivat este mai mare de 6 săptămâni. În zone cu risc ridicat de infecții cu bronșită și pseudopestă care se manifestă prin reacții serologice intens pozitive, se poate renunța la prima vaccinare cu vaccin viu.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la 2°C - 8 °C.

A se proteja de lumină.

A nu se congela.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei și se va agita pentru omogenizare.

Se va folosi instrumentar steril.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Cutii cu flacoane fiecare conținând 500 ml cu 1000 de doze.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru