

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS

vaccin inactivat contra rinotraheitei, bronșitei infecțioase, bolii newcastle și sindromul scăderii ouatului la păsări

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

MSD Animal Health, Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer
Olanda

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS - vaccin inactivat contra rinotraheitei, bronșitei infecțioase, bolii newcastle și sindromul scăderii ouatului la păsări.

Compoziție

Fiecare doză (0,5ml) de vaccin conține:

Substanțe active (viruși inactivați):

- virusul bronșitei infecțioase (IBV), tulpina M41 >4.0 log² unități VN;

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - virusul bronșitei infecțioase (IBV), tulpina 249g | >4.0 log ² unități VN; |
| - virusul rinotraheitei infecțioase a curcilor (TRT)
tulpina But1#8544 | >9,5log ² EID unități; |
| - virusul sindromului căderii ouatului (EDS,76), tulpina BC14 | >6,5log ² unități IH. |
| - virusul bolii Newcastle (NDV), tulpina Clone 30 | >60 PD ₅₀ doze |

Substanțe auxiliare:

adjuvant – parafină lichidă - 215 mg;

inactivator – formaldehidă.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Vaccinul este destinat pentru imunizarea găinilor de rase ușoare și a șeptelului parental pentru protecția găinilor de bronșită infecțioasă tip (Massachusetts) tulpinile D274/D207, bolii Newcastle, sindromul căderii ouatului și contra acțiunii negative a rinotraheitei infecțioase.

4. CONTRAINDICAȚII

Se vaccinează numai păsările sănătoase.

5. REACȚII ADVERSE

În caz de supradozare la animale poate apărea anorexie, salivație și apatie.

6. SPECII ȚINTĂ

Găini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de utilizare flaconul cu vaccin se lasă la temperatura camerei pînă la atingerea temperaturii de 15-25°C. Pentru vaccinare se folosește instrumentar steril. Flaconul deschis se va folosi timp de 3 ore.

Fiecărei păsări a se administra 0,5 ml vaccin i/muscular în mușchiul pieptului sau subcutan în partea dorsală a gâtului.

Programul de vaccinare

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS se administrează în jurul vârstei de 14-20 săptămâni, dar nu mai târziu decât cu 4 săptămâni înainte de începutul ouatului. Pentru un efect optim pasărea se recomandă să fie vaccinată cu vaccin viu contra bronșitei infecțioase, bolii

Newcastle și rinotraheita virală. Un rezultat mai bun se va obține la administrarea vaccinului Nobilis RT+Ibmulti+ND+EDS peste 4 săptămâni după imunizarea cu vaccin viu (praimer).

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la 2°C - 8 °C.

A se proteja de lumină.

A nu se congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

În caz de injectarea accidentală e necesar de adresat la medic cât de repede posibil și de informat că vaccinul este o emulsie apoasă cu ulei mineral.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 3 ore.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din sticlă de tip II (conform Farmacopeei Europene) sau din tereftalat de polietilenă cu a câte 500 sau 1000 doze.

Flacoanele sunt închise cu dopuri din cauciuc nitrilic și capace din aluminiu.

Fiecare ambalaj conține instrucțiune pentru administrare.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru