

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **Nobivac Tricat Trio**

vaccin antiviral pentru pisici

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

MSD Animal Health Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer Olanda

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Nobivac Tricat Trio, vaccin antiviral pentru pisici.

Per doză de 1 ml vaccin reconstituit:

Substanță activă:

- FCV viu, tulpina F9: minimum 4,6 log<sub>10</sub> PFU, maximum 6.4 log<sub>10</sub> PFU
- FHV-1 viu, tulpina G2620A: minimum 5.2 log<sub>10</sub> PFU, maximum 7.0 log<sub>10</sub> PFU
- FPLV viu, tulpina MW-1: minimum 4,3 log<sub>10</sub> CCID<sub>50</sub>, maximum 6.4 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub> (Doza Infectantă 50% pentru Culturi Celulare).

Nobivac Diluant:

Soluție salină cu tampon fosfat.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Imunizarea activă a pisicilor,

- pentru a reduce semnele clinice produse de infecția cu calicivirus felin (FCV) și herpes virus felin tip 1 (FHV-1, virusul rinotraheitei feline).
- pentru a preveni apariția semnelor clinice, leucopeniei și excreției de virus cauzate de infecția cu virusul panleucopeniei feline (FPLV).

Instalarea imunității: pentru FCV și FHV – 4 săptămâni, pentru FPLV .

Durata imunității pentru FCV- 1an, FHV, pentru FPLV – 3 ani.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

A nu se administra pe durata gestației sau lactației, deoarece nu s-au efectuat studii pe pisici gestante sau în lactație. Virusul FPL viu poate cauza probleme de reproducție la pisicile gestante și defecte la progeneri.

### **5. REACȚII ADVERSE**

La locul inoculării poate să apară o inflamație redusă ca dimensiuni însoțită de durere, care persistă timp de 1-2 zile. Poate să apară o creștere ușoară și tranzitorie a temperaturii corporale (până la 40°C) timp de 1-2 zile. În unele cazuri pot fi observate timp de până la 2 zile post vaccinare: strănut, tuse, scurgeri nazale, abatere ușoară și reducerea apetitului. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

### **6. SPECII ȚINTĂ**

Pisici.

### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Se utilizează 1 ml diluant pentru dizolvarea peletei liofilizate (= 1 doză). Se administrează subcutanat 1 ml vaccin reconstituit.

Folosiți instrumentar steril, fără urme de dezinfectant.

Schema de vaccinare:

Vaccinarea inițială: Două administrări a câte 1 doză, la un interval de 3-4 săptămâni. Prima administrare se poate face de la vârsta de 8-9 săptămâni iar cea de a doua de la vârsta de 12 săptămâni. (vezi de asemenea secțiunea 11)

Revaccinare: O singură doză (1 ml) conform următoarei scheme:

Revaccinarea împotriva calicivirusului felin, herpes virusului felin tip 1 trebuie efectuate anual.

Revaccinarea împotriva virusului panleucopeniei se efectuează la fiecare 3 ani

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

Peleta liofilizată: A se păstra la frigider (2°C- 8 °C).

A se proteja de lumină.

Nobivac Diluant: dacă se depozitează separat de fracția liofilizată, poate fi păstrat la o temperatură mai mică de 25°C.

A nu se congela.

Valabilitate după reconstituire: 30 minute.

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Se vor vaccina doar animale sănătoase.

Anticorpilor maternali care pot persista până la vârsta de 9-12 săptămâni pot influența negativ eficiența vaccinării.

Vaccinarea în prezența anticorpilor maternali poate să nu prevină complet semnele clinice, leucopenia și excreția de virus consecutive infecției cu FPLV.

În cazul în care se presupune existența unui nivel crescut de anticorpi maternali, programul de vaccinare va fi conceput în concordanță cu situația existentă.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

Perioada de valabilitate a vaccinului este de 33 de luni, iar solventului este de 60 de luni de la data producerii. A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

## **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

#### **14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Cutii de carton a câte 5 / 10 / 25 / 50 flacoane x 1 doză vaccin însoțite de Nobivac Diluant.

#### **15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)