

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Noredon C+

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

SC Vanelli SRL, Sos. Lasi-Tg. Frumos, km 10, Letcani, jud. Iași, 707280 România

Tel.: +40 232 253 442

Fax: +40 232 253 456

E-mail: office@vanellivet.ro

www.vanellivet.ro

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Noredon C+ – 3 mg/comprimate, pentru păsări (găini, broileri, curcani) florfenicol.

Substanța activă: Florfenicol – 3 mg.

Lista excipienților:

- Lactoză
- Amidon

- Stearat de magneziu
- Talc

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Păsări, în tratamentul și profilaxia (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) infecțiilor bacteriene produse de bacterii sensibile la florfenicol:

- boala respiratorie cronică (*Mycoplasma gallisepticum*)
- sinovita infecțioasă (*Mycoplasma synoviae*)
- aerosaculita (*Mycoplasma meleagridis*)
- colibaciloza (*Escherichia coli*)
- holera aviară (*Pasteurella multocida*)
- bordeteloza curcanilor (*Bordetella avium*)
- coriza infecțioasă (*Haemophilus paragallinarum*).

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra la animalele cu hipersensibilitate la florfenicol sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează în caz de rezistență cunoscută la florfenicol.

5. REACȚII ADVERSE

Cele mai des observate reacții adverse sunt diareea, inflamația perianală și prolapsul rectal. Aceste efecte sunt tranzitorii și dispar după întreruperea tratamentului.

6. SPECII ȚINTĂ

Păsări.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se administrează oral; păsări: 1 comprimat/kg greutate corporală/zi. Durata tratamentului este de 5-7 zile. Pentru evitarea subdozării și asigurarea unui dozaj corect, trebuie determinată cât mai exact greutatea corporală.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Păsări (găini, broileri, curcani): carne și organe: 28 de zile.

Nu se administrează la păsările ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCM poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la florfenicol și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polietilenă de înaltă densitate.

Flacoane cu 25 comprimate, 100 comprimate, și 1000 comprimate.

Cutie de carton conținând 1 flacon cu 25 comprimate.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru