

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **PESTISEN C**

vaccin viu, liofilizat contra Pestei Porcine Clasice

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

Bioveta a.s., Komenskeho 212/12, 68323 Ivanovice na Hane, Republica Cehă *telefon* +420 517 318 598 *fax* +420 517 363-281 *e-mail* [prodejna@bioveta.cz](mailto:prodejna@bioveta.cz)

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

PESTISEN C, vaccin viu liofilizat Vaccin viu contra Pestei Porcine Clasice, Liofilizat pentru prepararea soluției injectabile cu diluant.

Compoziția unei doze de vaccinare -

2 ml: A) Liofilizat

**Substanța activă:**

Virus viu atenuat contra pestei porcine, tulpina C (China) - min. 100 PD50 max. 1000 PD50

**Excipienți:**

Mediu liofilizat - până la 1 ml

B) Solventul Diluant E - 2 ml

**3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Vaccinul este destinat atât vaccinării preventive cât și vaccinării de urgență contra pestei porcine clasice.

**4. CONTRAINDICAȚII**

Nu se vaccinează animalele bolnave sau slăbite.

**5. REACȚII ADVERSE**

N-au fost observate.

Răspunsul anafilactic total poate să apară rar, evident, în decurs de 2 ore de la aplicarea vaccinului.

Medicamentele antihistaminice se utilizează imediat dacă se observă răspunsul anafilactic.

Frecvența reacțiilor adverse este definită folosind următoarea convenție:

- foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care au prezentat reacții adverse)
- frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 100 de animale tratate)
- mai puțin frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 1.000 de animale tratate)
- rare (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 10.000 de animale tratate)
- foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10.000 de animale tratate, inclusiv rapoarte izolate).

Dacă observați reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a funcționat, informați medicul veterinar.

**6. SPECII ȚINTĂ**

Purcei cu vârsta de 7 - 14 zile

**7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Doza - 2 ml, aplicare intramusculară.

Prima imunizare:

- Purceii proveniți de la scroafele nevaccinate se vaccinează de la vârsta de 7-14 zile;

- Purceii proveniți de la scroafele vaccinate se vaccinează de la vârsta de 7-8 săptămâni; animalele în vârstă de 4 săptămâni și mai mult pot fi vaccinate imediat în caz de afectare cu pesta porcină clasică.

A doua imunizare:

- Purceii înțărcați, destinați pentru îngrășat, sunt revaccinați după 2 luni; scrofițele sunt revaccinate cu o lună înainte de a fi însămânțate.
- Pentru a asigura imunitatea permanentă, porcii de reproducție trebuie revaccinați (efect de rapel) în fiecare doi ani sau anual, în conformitate cu decizia Serviciului Veterinar al țării respective.

Diluantul pentru dizolvarea liofilizatului se deschide strict înainte de utilizare. Vaccinul se utilizează în decurs de 2 ore de la dizolvare. În cazul vaccinării de urgență în masă, vaccinul poate fi utilizat și pentru vaccinarea animalelor gestante. Vaccinarea împotriva altor boli infecțioase ale porcinelor nu trebuie efectuată cu o săptămână înainte de vaccinare cu Pestisen C și o săptămână după aceasta.

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra în frigider separat de produse alimentare și furaje, la T°C 2°C + 8°C, în locuri inaccesibile copiilor.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Nu sunt.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii.

Perioada de valabilitate după reconstituire conform indicațiilor: se utilizează în decurs de 2 ore.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacoane de sticlă - 1 x 20 ml, 5 x 20ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml.

\*Nu toate dimensiunile ambalajelor pot fi comercializate.

### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)