

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **Nobivac DHPPi**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**  
MSD Animal Health, Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, Olanda

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**  
Nobivac DHPPi - vaccin liofilizat pentru suspensie injectabilă s.c.

1 doză de 1 ml conține:

Substanță activă:

- Virusul bolii Carre viu (CDV) tulpina Onderstepoort – minim 104,0 TCID<sub>50</sub> - maxim 10<sup>6,0</sup> TCID<sub>50</sub>
- Adenovirus canin viu tip 2 (CAV2) tulpina Manhattan LPV3 – minim 104,0 TCID<sub>50</sub> - maxim 10<sup>6,5</sup> TCID<sub>50</sub>
- Parvovirus canin viu (CPV) tulpina 154 – minim 107,0 TCID<sub>50</sub> - maxim 10<sup>8,4</sup> TCID<sub>50</sub>
- Virusul parainfluenței canine (CPI) tulpina Cornell - minim 105,5 TCID<sub>50</sub> – maxim 10<sup>7,0</sup> TCID<sub>50</sub>

Excipienti:

Vaccinul: Sorbitol, gelatină hidrolizată, fosfat disodc dihidrat, apă pentru injecții (înainte de liofilizare).

Solvent: fosfat disodc dihidrat, fosfat de potasiu dihidrogenat, apă pentru injecții.

Fracțiunea liofilizată este o peletă albă iar solventul (și produsul reconstituit ) este o suspensie ușor opalescentă.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Pentru imunizarea activă a câinilor în scopul prevenirii semnelor clinice si mortalitatii produse de infectia cu virusul bolii Carre, parvovirusul canin, adenovirusul canin si virusul parainfluenzei canine si prevenirea excreției virale cauzate de infectia cu parvovirusul si adenovirusul canin.

Debutul imunității este aproximativ la o săptămână de la vaccinare si durează 3 ani.

Debutul imunității pentru CPi este de la aproximativ 4 săptămâni și durează un an după vaccinare.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

A nu se vaccina animalele bolnave.

### **5. REACȚII ADVERSE**

La locul injectării în urma vaccinării se poate constata uneori o inflamație ușoară (<1cm<sup>3</sup>), tranzitorie.

În cazuri rare poate apare o creștere tranzitorie a temperaturii corporale și/sau reacții de hipersensibilitate acute tranzitorii (anafilaxie) – cu semne care pot include letargie, edeme faciale, prurit, dispnee, vomă, diaree sau colaps – pot apare la scurt timp după vaccinare.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

### **6. SPECII ȚINTĂ**

Câini.

### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Conținutul unui flacon de vaccin reconstituit se va injecta subcutanat. Vaccinul se reconstituie cu conținutul unui flacon (1.0 ml) Nobivac Lepto, unui flacon (1.0 ml) Nobivac Rabies, unui flacon (1.0 ml) Nobivac RL, sau al unui flacon (1.0 ml) de Nobivac Diluant.

Vârsta preferată pentru vaccinare împotriva hepatitei (CAV1), infecției cu CAV2 și infecției cu virusul parainfluenței este de 8-12 săptămâni deoarece este vârsta minimă la care anticorpii reziduali derivați maternal au ajuns la nivele care nu mai pot interfera cu răspunsul imun. Vârsta optimă pentru vaccinarea cățeilor împotriva jigodiei și parvovirozei este vârsta minimă la care anticorpii reziduali derivați maternal au ajuns la nivele care nu mai pot interfera cu răspunsul imun. În majoritatea cazurilor această vârstă este între 6 și 9 săptămâni dar pentru a asigura și protecția cățeilor cu nivele foarte mari ale anticorpilor maternali se recomandă ca vaccinarea finală împotriva acestor 2 boli să aibă loc în jurul vârstei de 12 săptămâni. Sunt incluse următoarele recomandări având în vedere că imunizarea cu Nobivac DHPPi face parte dintr-un program complex de vaccinare.

**a. Program pentru cățeii posibil expuși la infecția cu jigodie/parvo înainte de vârsta de 8-9 săptămâni; iar statusul ADM este necunoscut:**

4-6 săptămâni - Nobivac Parvo-C sau Nobivac Puppy DP

8-9 săptămâni - Nobivac DHPPi cu Nobivac Lepto

12 săptămâni - Nobivac DHPPi cu Nobivac Lepto, Nobivac Rabies sau Nobivac RL

**b. Program pentru cățeii a căror vaccinare începe la vârsta de 8-9 săptămâni:**

8-9 săptămâni - Nobivac DHPPi cu Nobivac Lepto

12 săptămâni - Nobivac DHPPi cu Nobivac Lepto, Nobivac Rabies sau Nobivac RL

**c. Program pentru cățeii a căror vaccinare nu începe înainte de vârsta de 12 săptămâni:**

12 săptămâni - Nobivac DHPPi cu Nobivac Lepto, Nobivac Rabies sau Nobivac RL

14-15 săptămâni – NobivacLepto.

**Rapelul:**

Se recomandă revaccinarea astfel:

1. Boala Carre, hepatita infecțioasă, parvoviroza canină – la fiecare 3 ani
2. Infecția cu virusul parainfluenței canine – în fiecare an.

Se vor vaccina doar câinii sănătoși și pentru asta se va face o examinare clinică adecvată înainte de administrare. După vaccinare, se va evita contactul cu potențialele surse de infecție o perioadă de 14 zile.

Se va folosi echipament steril pentru vaccinare, evitând în același timp contaminarea vaccinului cu urme de dezinfectant.

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra și transporta între 2 °C - 8 °C.

A nu se congeal.

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Nu există date disponibile referitoare la utilizarea concomitenată a acestui vaccin cu oricare altul cu excepția vaccinurilor din gama Nobivac.

De aceea, se recomandă ca nici un alt vaccin cu excepția celor menționate să nu fie administrat în interval de 2 săptămâni înainte de sau după vaccinarea cu Nobivac DHPPi.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii.

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 30 minute.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

## **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează cu prescripție veterinară.

## **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Cutii cu 5,10, 25 sau 50 flacoane x 1 doză

## **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)