

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

APRAVET

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Producătorul: Biovet JSC 39 Petr Racov str. 4550 Pescera, Bulgaria

Tel.:(+359 350)65 619, Fax: (+359 350)65 636

E-mail:biovet@biovet.com

Deținătorul: Huvepharma EOOD 3A Nikolay Haytov str. 1113 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 862 5331,

Fax: +359 2 862 5334 sales@huvepharma.com, www.huvepharma.com

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

APRAVET (Apramicină) 500 mg/g pulbere hidrosolubilă, (Apramycin); str. Camo. R. L.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se indică în tratamentul și profilaxia infecțiilor tractului digestiv - cel mai frecvent a

colibacteriozei și salmonelozei vițelilor, purceilor și puilor, în enteritele bacteriene a iepurilor.

- **CONTRAINDICAȚII**

A nu se indica pisicilor, rumegătoarelor cu rumenul funcțional; rumegătoarelor și păsărilor laptele și ouăle cărora se dau în consum uman; în caz de hipersensibilitate individuală la apramicină sau alte aminoglicozide.

- **REAȚII ADVERSE**

La administrarea conform instrucțiunii, nu apar. La viței, purcei și iepuri poate apărea diaree care trece de la sine.

- **SPECII ȚINTĂ**

Bovine, găini, iepuri, porcine.

- **POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Viței-20-40 mg apramicină sulfat/kg masă corp, timp de 5 zile;

Purcei-7,5-12,5 mg apramicină sulfat / kg masă corp, timp de 7 zile Pui-250-500 mg apramicină sulfat /1 apă (25-50 mg apramicină sulfat/kg masă corp), timp de 7 zile;

Iepuri-50-100 mg apramicină sulfat/l apă (10-15 mg apramicină sulfat/kg masă corp), timp de 5-8 zile;

1 gr de preparat conține 500 mg de apramicină sulfat. Se administrează intern, puilor, purceilor și iepurilor în amestec cu apa, vițelilor cu lapte sau substituent a laptelui.

Cantitatea necesară de preparat, diluată în volum de 10-15 ori mai mare de apă, apoi după dizolvare totală să fie adăugat în volumul necesar de apă.

- **PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Viței - 28 zile.

Purcei, pui și iepuri - 0 zile.

- **PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 0°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Soluția apoasă cu medicament se pregătește 1 dată în 3 zile.

Soluția cu lapte sau substituent a laptelui se pregătește înainte de administrare.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Borcane din plastic de culoare albă, cu volumul de 260 ml, capac din plastic cu inel detașabil.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, bd.Decebal 61H; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru