

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Oftalmo-gel

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO “Brovafarma”, Ucraina, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
Oftalmo-gel – masă semifluidă, omogenă, transparentă, de culoare galbenă.
Compoziție (per 1 g):

Ivermectină – 2,5 mg

Tilozină tartrat – 10 mg

Xeroform – 10 mg

Adjuvanți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Bovine – tratamentul telaziozei.

Câini, pisici, iepuri – tratamentul otitelor de origine parazitară (notoedroză, otodectoză, psoroptoză, sarcoptoză, chorioptoză, heiletioză).

Bovine, câini, pisici, iepuri – tratamentul miazelor provocate de larvele muștelor și prevenirea volfartiozei.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se aplica la animalele cu hipersensibilitate individuală

Contraindicată utilizarea concomitentă cu alte medicamente oftalmice

Nu se folosește în asociere cu peniciline, aminoglicozide, lincozamide și alte macrolide.

5. REACȚII ADVERSE

În caz de supradozare la animale poate apărea anorexie, salivație și apatie.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, câini, pisici, iepuri.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

În tratamentul telaziozei la bovine, capul animalului se fixează astfel încât ochiul să fie orientat în sus, iar cu ajutorul unei seringi adaptate cu alonjă se aplică 0,8-1,0 ml de gel în sacul conjunctival, masând ușor. Administrarea se face timp de 3-4 zile. În cazul inflamației pleoapelor, marginile acestora se curăță de cruste și se aplică gelul cu un tampon.

În cazul otitelor, se înlătură părul și crustele din pavilionul urechii și se aplică Oftalmo-gel de 1-2 ori pe zi. Prelucrarea se va face timp de 5-7 zile, până la însănătoșire. Se prelucrează ambele urechi concomitent. Dacă otita este de origine parazitară, aplicarea se repetă după 8-10 zile.

Pentru prevenirea volfartiozei, pe plăgile proaspete, în perioada caldă a anului, se aplică un strat de Oftalmo-gel.

Plăgile infestate cu larve de muște se prelucrează de 2 ori pe zi, până la vindecare (3-4 zile).

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 2°C + 20°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu sunt.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Seringi-tuburi din polimer a câte 4, 10 și 20g.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru