

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **Enroxil 5% pulbere**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**  
KRKA, d.d., Novo mesto», Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,  
Slovenija

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**  
Enroxil 5% pulbere – pulbere microgranulată perorală.

Ca substanță activă, 1 g conține 50 mg de enrofloxacină și substanțe auxiliare: lactoză și aerosil.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Enroxil 5% pulbere este utilizat în scop terapeutic și terapeutic-profilactic la păsările agricole pentru colibaciloză, salmoneloză, enterită necrotică, streptococoză și micoplasmoză; la porci - pentru salmoneloză, pasteureloză, pneumonie bacteriană și

enzootică, colisepticemie, rinită atrofică și alte boli cauzate de agenți patogeni sensibili la enrofloxacină.

Înainte de utilizarea medicamentului, ori de câte ori este posibil, ar trebui efectuat un test de sensibilitate al agentului patogen la enrofloxacină.

#### **4. CONTRAINDICAȚII**

Contraindicația pentru utilizarea medicamentului este hipersensibilitatea individuală crescută a animalului la fluoroquinolone.

Este interzisă utilizarea Enroxil 5% pulbere la găinile ouătoare și la tineretul de înlocuire cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de începerea ouatului, din cauza acumulării enrofloxacinei în ouă.

Enroxil 5% pulbere nu trebuie utilizat în cazul tulburărilor semnificative ale dezvoltării țesutului cartilagos, în cazul afecțiunilor sistemului nervos însoțite de convulsii sau în cazul izolării la animal a microorganismelor rezistente la fluoroquinolone.

#### **5. REACȚII ADVERSE**

Nu se observă efecte secundare sau complicații la păsări și porci atunci când medicamentul este utilizat în conformitate cu prezentele instrucțiuni.

#### **6. SPECII ȚINTĂ**

Porcine, păsări.

#### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Enroxil 5% pulbere se administrează amestecat cu furajul combinat în următoarele doze zilnice:

porcilor - 2,5 mg/kg greutate corporală a animalului, ceea ce corespunde cu 1,5 kg de Enroxil 5% pulbere la 1 tonă de furaj; în caz de salmoneloză și în cazurile severe ale bolii, doza medicamentului se dublează (5 mg/kg greutate corporală a animalului, sau 3 kg de Enroxil 5% pulbere la 1 tonă de furaj);

păsărilor - 10 mg/kg greutate corporală a animalului, ceea ce corespunde cu 2,0 kg de Enroxil 5% pulbere la 1 tonă de furaj.

Durata tratamentului pentru porci și păsări este de 3 zile, iar în caz de salmoneloză - 5 zile.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Sacrificarea **păsărilor** pentru carne este permisă nu mai devreme de **7 zile**, iar a **porcilor** - nu mai devreme de **5 zile** după ultima administrare a medicamentului.

Carnea animalelor, inclusiv a păsărilor, sacrificate forțat înainte de expirarea termenului specificat, poate fi utilizată pentru hrănirea animalelor cu blană.

#### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

#### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Enroxil 5% pulbere nu trebuie utilizat împreună cu antibiotice din seria tetraciclinelor, macrolide, lincosamide și cloramfenicol, precum și cu teofilina și medicamente antiinflamatoare nesteroidiene.

#### **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

#### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

#### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Enroxil 5% pulbere este ambalat în pungi multistrat din folie de aluminiu de 1 kg și saci de hârtie multistrat de 10 kg. Fiecare ambalaj este însoțit de instrucțiuni de utilizare.

#### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)