

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Enroxil 5%

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO"Biovet", 4550 Bulgaria, or.Peștera, str. Piotr Rakov 39 Reprezentanța
OOO"Huvepharma "(Bulgaria) în or. Moscova; 115191, or.Moscova, pr. 4 Roscinskii,
c. 19

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Enroxil 5% – soluție injectabilă.

Ca **substanță activă** în 1 ml conține 0,05 g de enrofloxacină, precum și componente auxiliare.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Bovine – afecțiuni ale tractului gastrointestinal și respirator, cauzate de bacterii și micoplasme (enterite și septicemie cauzate de E. Coli, pasteureloză, salmoneloză, stafilococi, micoplasmoză) și infecții secundare în afecțiunile virale.

Porcine – afecțiuni ale tractului respirator și gastrointestinal cauzate de microorganisme sensibile la enrofloxacină (Pasteureloză, pneumonie enzootică, bronhopneumonii bacteriene, enterite și septicemii cauzate de E. Coli, salmoneloză, sindrom MMA, rinită atrofică).

Câini – infecții bacteriene, inclusiv infecții ale aparatului gastrointestinal, respirator și genito-urinar, plăgi infectate și infecții ale canalului auditiv extern.

4. CONTRAINDICAȚII

Enroxil nu se administrează la cabaline și câini sub vârsta de sub 1 an.

5. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, porcine, ovine, caprine, câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Doza curentă pentru vițel și porc este de 1 ml Enroxil pentru 20 kg masă corporală (2,5 mg/1 kg). Doza curentă pentru câine este de 1 ml Enroxil pentru 10 kg masă corporală.

În infecțiile recurente ale tractului respirator și în salmoneloză, doza se dublează (5 mg enrofloxacină/1 kg masă corporală).

La vițel și câine administrarea se face subcutanat (s.c.), iar la porc intramuscular (i.m.).

Doza aplicată într-un punct nu va depăși:

- 10 ml – vițel
- 5 ml – oaie și capră
- 2,5 ml – miel, ied, câine

Tratamentul se repetă la un interval de 24 de ore.

Tratamentul la vițel și porc durează 2-3 zile, iar în cazul salmonelozei, 5 zile.

Tratamentul la câine durează 5-10 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne de vită, porc, oaie, capră – 10 zile.

Lapte de vacă – 5 zile.

Lapte de oaie, capră – 6 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu sunt.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă întunecată 100 ml.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru