

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### Stop-Prurit spray

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

OOO Apicenna, reg. Moscova, r. Balașiha, ș. Poltevscoe 4

E-mail: [e\\_karbysheva@apicenna.ru](mailto:e_karbysheva@apicenna.ru)

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Stop-prurit spray – soluție pentru uz extern.

Compoziție:

**Substanțe active:**

- Triamcinolon acetonidă
- Cloramfenicol
- Metronidazol
- Clorură de lidocaină

**Excipienți:**

- Alcool etilic
- Dimetilsulfoxid
- Dimetilformamidă
- Extract de gălbenele
- Polietilenglicol-400.

**3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Stop-prurit spray se indică câinilor și pisicilor în tratamentul dermatitelor acute și cronice, cum ar fi:

- Dermatite atopice
- Eczeme
- Neurodermite difuze
- Alopecie
- Dermatite infectate
- Reacții locale la înțepăturile de insecte

De asemenea, este indicat în tratamentul otitelor alergice și de etiologie bacteriană.

**4. CONTRAINDICAȚII**

Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele preparatului (inclusiv în anamneză), boli virale și diabet zaharat.

Nu se administrează:

- Intraauricular în caz de timpan perforat
- Animalelor gestante și în lactație
- Câțeilor și motănașilor până la vârsta de 8 săptămâni
- Animalelor productive.

**5. REACȚII ADVERSE**

La administrarea conform instrucțiunii, nu apar reacții adverse. În caz de sensibilitate individuală sporită a animalelor la componentele preparatului, în rare cazuri animalele pot manifesta apatie, salivare și dereglări gastrointestinale. În astfel de cazuri, administrarea se oprește și se indică terapie simptomatică.

**6. SPECII ȚINTĂ**

Câini, pisici.

## **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

În tratamentul dermatitelor, pe suprafața afectată, după o toaletare, se aspersează preparatul Stop-prurit spray în strat subțire, de două ori pe zi. Cura durează 10 zile. Flaconul se fixează vertical și se aspersează de la distanța de 10-15 cm.

Pentru tratamentul otitelor, preparatul se aspersează în interiorul pavilionului urechii până la umețare uniformă. În prealabil, pavilionul urechii se toaletează (se curăță de cruste și eliminări). După aplicare, pavilionul urechii se masează ușor pentru o difuziune uniformă. Aplicarea se efectuează de 2-3 ori pe zi, timp de 5-7 zile.

Cura poate fi prelungită la discreția medicului veterinar.

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Pentru a nu permite lingerea preparatului de pe suprafețele prelucrate, animalului i se îmbracă botniță sau guler de protecție, care se scoate după 15-20 de minute de la aspersare.

Se recomandă evitarea abaterilor de la schema de bază a administrărilor pentru a nu diminua eficiența preparatului. În caz de omitere a unei prelucrări, aplicarea se reia în aceeași doză, conform aceleași scheme.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacon din polimer cu pulverizator.

### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)