

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Catobevit

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Deținătorul certificatului de înregistrare:

KRKA d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto
Slovenia

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto
Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven
Germania

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml – soluție injectabilă pentru bovine, cabaline, câini, pisici.

Fiecare ml conține:

Substanțe active:

- Butafosfan
- Cianocobalamină (vitamina B12)

Excipienți:

- Fenol

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratament preventiv sau de susținere a tulburărilor metabolice sau de reproducere, atunci când este necesară suplimentarea cu fosfor și cianocobalamină.

În cazul tulburărilor metabolice din perioada peri-parturii, tetanie și pareză (febra laptelui), se administrează suplimentar față de magneziu și, respectiv, calciu.

Susținerea funcției musculare în cazul deficitului de fosfor și/sau cianocobalamină.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

5. REACȚII ADVERSE

La pisici, după injectarea subcutanată în regiunea interscapulară, pot apărea reacții la locul injectării (tumefacție, edem, eritem și indurație).

Dacă observați orice reacție adversă, inclusiv cele care nu sunt deja incluse în acest prospect, sau considerați că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Bovine, cabaline: intravenos

Câini și pisici: intravenos, intramuscular, subcutanat.

Specie/subcategorie	Butafosfan (mg/kg)	Vitamina B12 (µg/kg)	Cantitate de produs (ml/kg)	Cale de administrare
Bovine	2,0 – 5,0	1,0 – 2,5	0,02 – 0,05	IV

Viței	3,3 – 5,6	1,65 – 2,8	0,033 – 0,056	IV
Cabaline	2,0 – 5,0	1,0 – 2,5	0,02 – 0,05	IV
Mânji	3,3 – 5,6	1,65 – 2,8	0,033 – 0,056	IV
Câini	2,5 – 25	1,0 – 2,5	0,025 – 0,25	IV, IM, SC
Pisici	10 – 50	5 – 25	0,1 – 0,5	IV, IM, SC

La nevoie doza se poate repeta.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Dopul flaconului poate fi perforat de până la 25 de ori. Dacă sunt necesare mai mult de 25 de perforații, se recomandă utilizarea unui ac aspirator.

Pentru tratamentul câinilor și pisicilor, se recomandă utilizarea ambalajului de 100 ml.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Bovine și cabaline (carne și organe): zero zile

Lapte: zero ore.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Se recomandă determinarea cauzei (cauzelor) tulburărilor metabolice sau reproductivă, pentru a stabili cele mai adecvate măsuri de prevenire și tratament, precum și necesitatea suplimentării cu fosfor și vitamina B12.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul veterinar

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre substanțe trebuie să evite contactul cu produsul.

Produsul poate fi ușor iritant pentru piele sau ochi. Evitați expunerea cutanată și oculară. În caz de expunere accidentală, clătiți pielea și/sau ochii cu apă.

Gestație și lactație

Siguranța produsului nu a fost stabilită la vaci gestante și în lactație, iepi, cățele și pisici. Cu toate acestea, utilizarea în timpul gestației și lactației la aceste specii nu ar trebui să prezinte probleme deosebite.

Incompatibilități majore

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 28 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă tip II, de culoare chihlimbar, de 100 ml, cu dop din cauciuc bromobutlic și capac din aluminiu cu lamelă detașabilă tip flip-off.

Flacon din sticlă tip I, de culoare chihlimbar, de 250 ml, cu dop din cauciuc bromobutlic și capac din aluminiu cu lamelă detașabilă tip flip-off.

Dimensiunea ambalajului:

Cutie cu 1 flacon de 100 ml

Cutie cu 1 flacon de 250 ml

*Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru