

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Unguent Camforat 10%

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Producător:

AO Uzina „Veterinarnîe preparatî”, 601508, reg. Vladimir, or. Gusi-Hrustalinîi, str. Himzavodskaia 2

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Unguent Camforat 10%.

Compoziție: 100 g **conține:** camfor- 10 g,
excipienți: lanolin, vazelină.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Unguentul camforat 10% se indică în tratamentul artritelor, bursitelor, tendovaginitelor, miozitelor la animale și în mastita subclinică la vaci în repaus mamar.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se folosi în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă, la adjuvant sau la oricare dintre excipienți și pe suprafețe lezionate.

5. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse sau complicații în urma administrării conform prospectului dat nu apar. În caz de sensibilitate sporită a animalului, pot apărea reacții individuale (iritarea pielii, vertij sau excitare). În astfel de cazuri, cu un tampon se șterge de pe suprafața pielii unguentul, se spală, iar animalului i se administrează antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Unguentul se folosește extern, aplicându-l în strat subțire cu o spatulă, cu un tifon din bumbac sau cu mâna folosind mănușă sterilă pe suprafața afectată și fricționând ușor timp de 2-3 minute, de 1-2 ori pe zi, timp de 10-12 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe – 24 ore.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu unguentul camforat 10%, este important să se respecte regulile comune de igienă personală și tehnica de securitate prevăzută pentru lucrul cu preparate farmaceutice. Persoanelor cu hipersensibilitate le este recomandat să evite contactul direct cu medicamentul. În timpul lucrului, este interzis fumatul, consumul de alimente și băuturi. În caz de contact accidental cu pielea sau cu tunicile mucoase oculare, acestea se spală din abundență cu apă. În caz de înghițire sau apariție a reacțiilor alergice, este necesar să se adreseze unei instituții medicale (cu eticheta sau instrucțiunea la îndemână).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Gestație:

Femelelor gestante și nou-născuților li se aplică cu precauție, doar în urma evaluării de către medicul veterinar și dacă beneficiul depășește riscul.

Lactație:

Nu se recomandă femelelor în lactație.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se folosi concomitent cu alte medicamente topice cu aceleași indicații.

Supradozare:

Nu au fost depistate simptome specifice supradozării.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu sunt.

Incompatibilități majore:

În lipsa informațiilor, a nu se amesteca cu alte medicamente de uz veterinar.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Borcane și capace securizate din polimer, cu dimensiuni de 17 g, 40 g, 130 g și 400 g.
Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru