

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Levamisol 75

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO" NITA-FARM", 410010, or. Saratov, str. Osipova V.I. 1

Tel/fax +7(4852)338-600

e-mail: client@nita-farm.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Levamisol 75 - soluție injectabilă. Denumirea internațională nepatentată: levamizol. 1 ml conține în calitate de **substanță activă**: levamisol hidroclohid (recalculat la levamisol de bază) – 75 mg și adjuvanți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Levamisol 75 se folosește pentru dehelmintizarea:

- Bovinelor, caprinelor și ovinelor în caz de dictiocauloză, hemonhoză, bunostomoză, esofagostomoză, nematodiroză, ostertagioză, habertioză, cooperioză și strongiloidoză;
- Porcinelor în ascaridoză, esofagostomoză, strongiloidoză, tricocefaloză, hiostrongiloză și metastrongiloză;

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra Levamisol 75 în cazul sensibilității individuale sporite la componentele preparatului și animalelor slăbite, istovite sau bolnave de boli infecțioase. Este contraindicat vacilor gestante în ultimul trimestru, oilor, caprelor, scoafelor și cățelelor în al doilea semestru al gestației. A nu se administra concomitent sau timp de 10 zile înainte și după folosirea preparatelor fosfororganice, a pirantelului, morantelului și levomicetinei. Este interzisă folosirea concomitentă cu etanolul.

5. REACȚII ADVERSE

În urma administrării preparatului Levamisol 75 conform instrucțiunii date, reacții adverse și complicații nu apar. În caz de apariție a reacției alergice, administrarea se stopează și se recurge la terapie simptomatică și antihistaminice.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, porcine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Administrarea preparatului nu necesită dietă cu foamea în prealabil și nici folosirea laxativelor. Se administrează 1 dată, s/cutan (bovinelor, ovinelor, caprinelor se permite i/muscular) în doză de 7,5 mg/10 kg masă corp, ceea ce corespunde la 1 ml de Levamisol 75/10 kg masă corp.

Doza maximală administrată să nu depășească:

- Bovine – 30 ml;
- Porcine – 20 ml;
- Ovine – 4,5 ml.

Volumul maximal de preparat injectat într-un singur punct nu trebuie să depășească:

- Bovine – 20 ml;
- Porcine – 10 ml;
- Ovine și viței – 5 ml;

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea animalelor pentru consum uman se permite peste 7 zile de la ultima administrare. În caz de sacrificare înainte de expirarea termenului limită, carcasele pot fi folosite în hrana animalelor de blană. Laptele se interzice în consum uman timp de 3 zile de la ultima administrare sau se fierbe și se dă în hrana animalelor.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

În caz de supradozare poate apărea vomă, colici, diaree, salivație (la porci și câini), reacții alergice (prurit, urticarie). Simptomele apărute dispar de la sine. A nu se administra concomitent sau timp de 10 zile până la și după folosirea preparatelor fosfororganice, a pirantelului, morantelului și levomicetinei. Este interzisă folosirea concomitentă cu etanolul. Înainte de prelucrările în masă, fiecare serie de preparat se testează pe un grup nu prea mare de animale (5-10 capete), care se urmăresc timp de 3 zile. În lipsa complicațiilor, preparatul se administrează la tot șeptelul.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – 28 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din sticlă a câte 20, 50 și 100 ml, ermetic închise cu dop de cauciuc și capac din aluminiu securizat.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru