

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Gentamicină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
KRKA, d.d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
Gentamicină – pulbere hidrosolubilă perorală pentru viței, purcei și păsări.

Substanțe active: 100 g pulbere conțin 10 g gentamicină sulfat.

Adjuvanți: lactoză.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Infecții bacteriene ale organelor tractului digestiv, în special salmoneloza vițelilor, purceilor și puilor.

Dizenteria și campilobacterioza purceilor.

Infecții primare și secundare ale tractului digestiv (în timpul sau după viroze, toxicoze și altele).

4. CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

5. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, porcine, păsări domestice.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Viței – În tratament individual, preparatul se administrează în prima zi – 5 g/100 kg greutate, divizat în 2 prize cu un interval de 12 ore. În următoarele 2-4 zile, 4 g/100 kg greutate. În tratamentul în grup, se diluează 12,5 g de preparat în 10 litri de apă și se administrează în consum continuu pe parcursul a 3-5 zile.

Purcei –

- În colibacterioză: 11 g/100 litri apă pe parcursul a 3 zile.

- În salmoneloză: 15 g/100 litri apă – 4 zile.

- În campilobacterioză și dizenterie: 22 g/100 litri apă – 5 zile.

Păsări – 5 g/100 litri apă timp de 5-7 zile.

Supradozare (simptome, antidot):

În literatură nu sunt disponibile date.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carcase:

- Viței, purcei – 10 zile

- Păsări – 25 zile

Viscere:

- Viței, purcei – 14 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Preparatul administrat animalelor trebuie să fie bine diluat în apă. Soluția de gentamicină se prepară zilnic. Sărurile (de sodiu, calciu, potasiu), sulfații, clorurile, fosfații și nitrații diminuează considerabil efectul gentamicinei, motiv pentru care nu se recomandă combinarea ei cu alte preparate.

Indicații speciale pentru personalul care administrează preparatul:

După lucrul cu preparatul, mâinile se spală bine.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

5 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pungi cu 50 g, 100 g, 500 g și 1 kg pulbere.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru